

## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

CHLORNITROMYCIN 2% ointment  
ХЛОРНИТРОМИЦИН 2% маз  
Хлорамфеникол



### ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

- Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!
- Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.

### В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Хлорнитромицин маз и за какво се прилага
2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Хлорнитромицин маз
3. Как се прилага Хлорнитромицин маз
4. Възможни нежелани реакции
5. Условия на съхранение
6. Допълнителна информация

Хлорнитромицин маз  
Хлорамфеникол

Лекарствено вещество в 1 g маз: Хлорамфеникол 20 mg  
Помощни вещества: метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, ланолин, течен парафин, твърд парафин, бял вазелин

Chornitromycin маз 20 g в двойно лакирани алуминиеви туби

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХЛОРНИТРОМИЦИН МАЗ И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Хлорнитромицин е широкоспектърен антибиотик, който спира развитието на болестотворни микроорганизми, а във високи дози ги унищожава.

*Хлорнитромицин маз се прилага при посочените индикации само в случаите, когато други лекарствени продукти не са ефикасни или са противопоказани!*

Хлорнитромицин маз се прилага за лечение на инфекции на кожата, причинени от чувствителни на антибиотика микроорганизми като:

- Пиодермии - абсцеси, фурункули, импетиго, периферни инфекции, фоликулити;
- Вторично инфектирани дерматози;
- Вторично инфектирани рани.



## **2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С ХЛОРНИТРОМИЦИН МАЗ**

Продуктът не се прилага при:

- Свръхчувствителност към хлорамфеникол или към някое от помощните вещества;
- Кожни гъбични инфекции.

**При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:**

Продуктът се прилага с повишено внимание при пациенти с нарушения в кръвотворенето (апластична анемия, миелопатия), новородени и недоносени деца.

Поради изразената токсичност на продукта, той се използва като резервен антибиотик при липса на друга алтернатива. При продължително лечение (над 2 седмици) се препоръчва контролиране на кръвната картина. В случай на промени в кръвната картина лечението с Хлорнитромицин маз трябва да се прекрати незабавно.

### **Приложение на хлорнитромицин маз и прием на храни и напитки**

Хлорнитромицин маз е продукт за приложение върху кожата.

### **Бременност и кърмене**

*Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт*

Не се препоръчва приложение на Хлорнитромицин маз по време на бременността и в периода на кърмене.

### **Шофиране и работа с машини**

Хлорнитромицин маз не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

### **Приемане на други лекарства**

*Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или скоро сте приемали скоро други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар*

Хлорнитромицин маз дори и приложен локално може да засили действието на някои продукти, потискащи костномозъчната функция като аналгетици, сулфонамиди и имunosупресори.

В комбинация с еритромицин ефектът на двата продукта може да бъде намален.

### **Данни за помощните вещества**

В състава на продукта са включени като помощни вещества т. нар. парабени, които могат да доведат до уртикария и рядко до алергични реакции от бърз тип като бронхоспазъм.

## **3. КАК СЕ ПРИЛАГА ХЛОРНИТРОМИЦИН МАЗ**

*Винаги прилагайте Хлорнитромицин маз според инструкциите на лекуващия Ви лекар!*



Хлорнитромицин маз се нанася на тънък слой върху засегнатите участъци 3-4 пъти дневно, които предварително се почистват от корички, гной и остатъци от предишни намазвания.

Превръзка се поставя върху закрити, триещи се в дрехите повърхности.

**Ако сте приели по-голямо количество от лекарството**

*При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ към лекар!*

Няма съобщения за предозиране с продукта.

**Ако сте пропуснали да приложите Хлорнитромицин маз**

Ако сте пропуснали да приложите поредната доза, то приложете я час по-скоро.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

*Както всеки друг лекарствен продукт, Хлорнитромицин маз може за предизвика нежелани лекарствени реакции*

След третиране е възможно локално дразнене със сърбеж или парене, ангионевротични едеми, уртикария, везикуларни дерматити.

*Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.*

#### **5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ**

При температура под 25° С!

Срок на годност: 3 (три) години

#### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД

ул. "Атанас Дуков" 29

1407, София България

Производител

"Балканфарма-Разград" АД

бул. "Априлско въстание" №68

7200, Разград

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД

ул. "Атанас Дуков" 29

1407, София България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – Ноември 2008 г.

