


**COLDREX\* Tablets**  
**КОЛДРЕКС\* Таблети**



Моля преди употреба, прочетете внимателно тази листовка.

**Състав:** Всяка таблетка съдържа като лекарствени вещества:

Paracetamol	500 mg.
Caffeine	25 mg.
Phenylephrine hydrochloride	5 mg.
Terpin hydrate	20 mg.
Ascorbic acid	30 mg.

Също така съдържа помощните вещества: разтворимо нишесте, царевично нишесте, талк, стеаринова киселина, поливидон, натриев сорбат, натриев лаурил сулфат и оцветител сънсет жълто.

Опаковката съдържа 12 таблетки.

**Показания:** Coldrex Tablets е показан за краткотрайно облекчаване на симптомите при грип, възпалителни заболявания на горните дихателни пътища (настинки) и висока температура.

**Характеристики:** Coldrex Tablets съдържа парацетамол - аналгетик (болкоуспокояващо средство) и антипиретик (понижава температурата), фенилефрин хидрохлорид - деконгестант, който предизвиква отбъбване на лигавицата на носа и синусите, помагайки Ви да дишате по-леко, кофеин, който действа като лек стимулант, терпин хидрат - експекторант (отхрачващо средство) и витамин С, който обикновено се прилага при грип и възпалителни заболявания на горните дихателни пътища (настинки) поради повишените нужди на организма, особено в началния стадий на заболяването.

**Противопоказания:** **Не приемайте други лекарства, съдържащи парацетамол.**

Не взимайте Coldrex Tablets, ако сте алергични към парацетамол, фенилефрин хидрохлорид, кофеин, терпин хидрат, витамин С или някое от помощните вещества; ако имате чернодробни или тежки бъбречни заболявания; ако страдате от повишена функция на тироидната жлеза, диабет или се лекувате от високо кръвно налягане или сърдечни заболявания; или ако взимате трициклични антидепресанти, бета-блокери и приемате или през последните две седмици сте приемали инхибитори на моноаминооксидазата.

**Предупреждения / предпазни мерки:** Преди да вземете Coldrex Tablets се консултирайте с Вашия лекар, ако взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин. Ако сте бременна или кърмите, консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Coldrex Tablets.

**Дозировка:**

**Възрастни и деца на и над 12 години:** Да се взимат по две таблетки до четири пъти на ден.

**Деца (6 до 12 години):** Да се дава по една таблетка до четири пъти на ден. Да не се дава на деца под 6 години, освен по лекарско предписание.

Да не се взима на интервали по-кратки от 4 часа.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако високата температура продължи повече от 3 дни, а другите симптоми – повече от 5 дни.

**Не надвишавайте посочената доза.** Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако приемете повече от посочената доза, незабавно потърсете медицинска помощ, дори и да се чувствате добре.

**Нежелани реакции:** При парацетамол, нежеланите реакции са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Фенилефрин може да причини гадене, главоболие, леко повишаване на кръвното налягане и много рядко сърцебиене. Тези ефекти са преходни. Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате някакви неочаквани реакции.

**Срок на годност:** Не използвайте след датата посочена на опаковката.  
Срок на годност: 4 години.

**Условия на съхранение:** Да се съхранява на сухо място.

**Да се пази на места, недостъпни за деца.**

**Притежател на разрешението за употреба:**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, UK

Coldrex\* е търговска марка. GSK (logo)