

П  
ОДОБРЕН  
ДАТА R-7100/14.10.08

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**COLDREX MaxGrip Lemon 1000mg/10mg/40mg**  
powder for oral solution paracetamol/phenylephrine hydrochloride/ascorbic acid

**КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон 1000mg/10mg/40mg**  
прах за перорален разтвор  
парацетамол/фенилефринов хидрохлорид/аскорбикова киселина

**Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

**КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон** краткотрайно облекчава симптомите при грип и простуда. Тези симптоми включват главоболие, висока температура, мускулни болки, запущен нос, болки при възпалено гърло.

#### Как действа КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон?

#### КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон съдържа:

- Парацетамол – аналгетик (болкоуспокояващо средство) и антипиретик (понижава температурата).
- Фенилефринов хидрохлорид – деконгестант, който намалява отока на лигавицата на носа и синусите, помагайки Ви да дишате по-леко и
- Аскорбинова киселина (витамин С) – която обикновено се прилага при грип и настинка поради повишението нужди на организма, особено в началния стадий на заболяването.

**Активните вещества на КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон не причиняват съниливост.**

### 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН

**Не приемайте с други лекарства, съдържащи парацетамол.**

**Не приемайте с други лекарства, предназначени за грип, простуда или запущен нос.**

**Не приемайте КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон, ако:**

- сте алергични към парацетамол, фенилефринов хидрохлорид или витамин С или към някоя от другите съставки, посочени по-горе;
- страдате от чернодробно или тежко бъбречно заболяване;
- страдате от повишена функция на щитовидната жлеза, диабет или сте лекувани от високо кръвно налягане или сърдечни заболявания;



- вземате антидепресанти, бета-блокери и приемате или сте приемали, през последните две седмици, инхибитори на моноаминооксидазата;
- страдате от вродена непоносимост към фруктоза, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарно/изомалтозен дефицит.

Всяко саше съдържа 4g захароза.



**Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон ако:**

- вземате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване на нивото на холестерин;
- приемате лекарства за разреждане на кръвта (например warfarin);
- сте на диета с ниско съдържание на натрий. Всяко саше съдържа 0.12g натрий;
- сте бременна или кърмите;
- консумирането на алкохол (особено в по-големи количества – над 90 мл. концентрат) едновременно с приемането на КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон повишава риска от чернодробно увреждане. Ако приемате по-големи количества алкохол, уведомете лекуващия лекар преди да вземете лекарствения продукт.



**3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН?**

**За перорално приложение.**

Изсипете едно саше в чаша и напълнете с топла вода. Разбъркайте докато се разтвори. Прибавете, ако е необходимо, студена вода и захар или мед по желание.

**Възрастни и деца на и над 12 години:**

Да се взима по едно саше на всеки 4 часа.

Не взимайте повече от 4 (четири) сашета за период от 24 часа.

Да не се взима на интервали по-кратки от 4 часа.

**Не давайте на деца под 12 години, освен по лекарско предписание.**

Консултацията с лекар е наложителна, ако високата температура продължи повече от 3 дни, а другите симптоми – повече от 5 дни.

Не надвишавайте посочената доза.

**Какво трябва да направите, ако приемете прекалено голямо количество?**

Ако приемете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете медицинска помощ, дори и да се чувствате добре. Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб.

**4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Много рядко е съобщавано за промени в кръвната картина, но тези промени не са били задължително свързани с приемането на парацетамол.

Фенилефрин може да причини гадене, главоболие, леко повишаване на кръвното налягане и много рядко сърцебиене. Тези ефекти са преходни.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако наблюдавате някакви неочеквани реакции.

**5. СЪХРАНЕНИЕ НА КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН**

**Да се пази на място, недостъпно за деца.**

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката



## 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### Какво съдържа КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон?

Всяко саше съдържа като активни вещества:

парацетамол	1000mg
фенилефринов хидрохлорид	10mg
аскорбинова киселина (витамин С)	40mg

Всяко саше съдържа и захароза, лимонена киселина, натриев цитрат, царевично нишесте, натриев цикламат, захарин натрий, силициев диоксид (колоиден, безводен), лимонена есенция и природен куркумин (Е 100).

### Как изглежда КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон и какво съдържа опаковката?

Всяко саше КОЛДРЕКС МаксГрип Лимон съдържа 6.427 g бял прах с мириз на лимон.

Опаковката може да съдържа 5 или 10 сашета с прах за перорален разтвор.

### Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,  
GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Великобритания

Производител е:

SmithKlineBeecham S.A., Ctra. De Ajalvir, Km 2,5,  
Alcala de Henares, 28806, Madrid, Испания

Срок на годност – 3 години.

Без лекарско предписание.

Последна актуализация – септември 2008

GSK logo

Coldrex\* и MaxGrip са регистрирани търговски марки на GlaxoSmithKline group of companies.

