



Cormagnesin 400 инжекционен разтвор

Уважаеми пациенти !

Моля прочетете следващата информация за употреба внимателно, защото тя съдържа важни данни за това, което Вие трябва спазвате при употребата на лекарствения продукт. Ако имате въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Cormagnesin[®] 400

Кормагнезин[®] 400

Активно действащо вещество: магнезиев сулфат

Състав:

- активно действащи съставки:

1 ампула Cormagnesin[®] 400 с 10 мл инжекционен разтвор съдържа:

2000 mg Magnesium sulphate = 16,6 mmol Magnesium (Mg) = 33,2 mval Mg = 403,8 mg Mg

- помощни вещества:

сярна киселина (до 0,055 mcg за поддържане на pH) и вода за инжекции

Лекарствена форма и съдържание:

10 ампули с по 10 мл инжекционен разтвор

Лекарствен продукт съдържащ микроелементи

Притежател на регистрацията:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Straße 7

71034 Böblingen

Germany

Tel.: 07031-6204-0

Fax: 07031-6204-31

Фармацевтично предприятие – производител (име, адрес):

Solpharm GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 17

34212 Melsungen

Germany

Области на приложение:

При състояния на сериозен магнезиев дефицит, които могат да причинят смущения в мускулната и сърдечната дейност, крампи на прасеца. Също и при магнезиев дефицит, който може да възникне при непълноценно хранене, при прием на някои медикаменти (контрацептивни средства, диуретици и лаксативни средства), алкохолизъм, или при недостатъчна компенсация на повишена потребност: по време на бременност (повишена склонност към застрашаващ аборт, риск от еклампсия), кърмене и при стрес.

Противопоказания:

Кога не трябва да се прилага Cormagnesin[®] 400 ?

Препаратът не следва да се прилага при мускулна слабост (миастения гравис), забавен сърдечен ритъм (изразена брадикардия), образуване на камъни в бъбреците (магнезиево-калциево-амониево фосфатна литиаза), смущения в провеждането на импулсите в сърцето (AV-блок) и тежки нарушения на бъбречната функция (креатининов клирънс под 20 ml/min).

Какво трябва да съблюдавате по време на бременност и кърмене?

Няма никакви съмнения/противопоказания относно приложението на препарата по време на бременност и кърмене.

Какво трябва да се съблюдава при деца и възрастни хора?

Не се препоръчват никакви специални предупредителни указания.

Предпазни мерки при употреба и специални предупреждения

Какви предпазни мерки трябва да се спазват?

Cormagnesin® 400 не трябва да се прилага едновременно с барбитурати, наркотични или хипнотични лекарствени продукти, поради риск от подтискане на дишането.

Причиняваните от магнезиевия дефицит заболявания може да имат и други причини за възникването си. Ако проведеното лечение не покаже ефект, при сериозни оплаквания, трябва да потърсите Вашия лекар.

Какво трябва да съблюдавате при шофиране, работа с машини и при работа без сигурна опора?

Не са необходими предпазни мерки.

Взаимодействия

Кои други лекарствени продукти повлияват действието на Cormagnesin® 400 ?

При едновременно интравенозно прилагане на калциеви соли намалява действието на магнезия. Миорелаксанти от типа на кураре потенцират действието на магнезия върху моторните плочки.

Кои други лекарствени продукти повлиява с действието си Cormagnesin® 400 ?

Cormagnesin® 400 не трябва да се смесва с инжекционни разтвори, съдържащи калций или фосфати, тъй като могат да се образуват утайки и да настъпят взаимодействия.

Моля, имайте предвид, че тези данни важат и за лекарствени продукти, чийто прием е приключил неотдавна.

Кои храни и напитки трябва да избягвате ?

Не се препоръчват специални предупредителни указания.

Дозировка, начин и продължителност на приложение

Следващите указания важат само в случай, че вашият лекар не е предписал *Cormagnesin® 400* по друг начин. Моля, придържайте се към предписанията за приложение, в противен случай *Cormagnesin® 400* не може да упражни лечебния си ефект!

По колко и колко често трябва да се прилага Cormagnesin® 400?

Дозировката се определя от степента на магнезиевия дефицит, респ. от потребностите на организма.

1 ампула Cormagnesin® 400 се инжектира бавно интравенозно. Инжектирането на една ампула се повтаря след интервал от 1 до 2 дни.

Указание:

Cormagnesin® 400 е приложим без ограничения като комбинирана инжекция (в една спринцовка) с Aspisol® (DL-lysino[acetylsalicylate]), като трябва да се инжектира минимум за 30 минути. Може да се очаква, че настъпването на действието на двата препарата в смес и продължителността на действие не са повлияни.

Cormagnesin® 400 е приложим без ограничения като комбинирана инфузия (в един инфузионен разтвор) с Aspisol® (DL-lysino[acetylsalicylate]), като вливането трябва да се осъществи минимум за 2 часа. Може да се очаква, че настъпването на действието на двата препарата в смес и продължителността на действие не са повлияни.

Как и кога трябва да се прилага Cormagnesin® 400?

Cormagnesin® 400 се инжектира много бавно интравенозно (първите 3 мл за 3 минути), в лежачо положение на пациента.

Колко продължително може да се прилага Cormagnesin® 400?

Продължителността на лечението се определя от подобрието във Вашите оплаквания и се назначава от Вашия лекар.

Грешки при приложение и предозиране

Какво трябва да се направи, ако Cormagnesin® 400 е приложен в много големи дози (случайно или преднамерено предозиране)?

Като антидот при симптоми на предозиране (понижаване на кръвното налягане, подтискане на дишането) се препоръчва незабавно интравенозно инжектиране на калций.

Нежелани лекарствени реакции

При висока дозировка може да настъпи забавяне на сърдечния ритъм (брадикардия), понижаване на кръвното налягане, смущения в проводимостта и разширения на периферните кръвоносни съдове. Едно твърде бързо инжектиране може да предизвика временно повръщане, гадене, главоболие, топли вълни, световъртеж и състояния на неспокойствие.

Ако наблюдавате върху себе си нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете ги на Вашия лекар или фармацевт.

Какви мерки трябва да се предприемат при настъпване на нежелани лекарствени реакции на лекарствения продукт?

При поява на нежелани лекарствени реакции, обърнете се към Вашия лекуващ лекар.

Указания и упътвания за срока на годност на лекарството

Датата на изтичане на годността е отпечатана както върху опаковката, така и върху ампулния етикет. Не употребявайте лекарството след тази дата!

Как трябва да съхранявате Cormagnesin® 400?

Съхранявайте лекарствения продукт на недостъпни за деца места!

Актуалност на информацията: 09/2006

За информация на нашите пациенти

Вашият лекар Ви е предписал Cormagnesin® 400 за да въведе бързо и в достатъчни количества магнезий в организма Ви. По този начин лекарят постига бързо облекчаване на Вашите оплаквания.

За да се предотврати рязкото понижаване на магнезиевото ниво между отделните инжекции, се препоръчва редовно приемане на магнезий под форма на magnerot® таблетки.

Магнезият играе централна роля в организма.

Той е незаменим за протичането на жизненоважни процеси, като обмяна на въглехидрати, протеини, мазнини и нуклеиновни киселини, както и за всички енергетични процеси.

Как може да се стигне до магнезиев дефицит ?

Недостиг на магнезий може да настъпи в следствие на недостатъчния му прием, неправилно хранене (прекалено много мазнини и белтъчини, хранителни продукти с ниско съдържание на магнезий) и небалансирани диети за отслабване.

Често причината за магнезиев дефицит се дължи и на повишеното му отделяне от организма, напр. при алкохолизъм, употреба на слабители средства, чревни заболявания и прием на определени лекарствени продукти.

Потребността от магнезий се повишава по време на бременност и кърмене.

Как можете да установите наличие на магнезиев дефицит?

Недостиг на магнезий може да се прояви например с поява на мускулни крампи (особено нощни крампи на прасеца), но също и с карампи на мускулите на врата, раменете и гърба. Магнезиевият дефицит може да причини разтуптяване на сърцето (нарушения в сърдечния ритъм), участване на сърдечния ритъм и болки в сърдечната област.

Главоболне, мигрена и функционални стомашни и чревни крампи могат да настъпят вследствие от недостиг на магнезий.