

## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

CORTIMYCIN 10 mg/g + 3,5 mg/g cream  
КОРТИМИЦИН 10 mg/g + 3,5mg/g крем

Хидрокортизонов ацетат / Неомицин



### ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

- Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!
- Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.

### В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Кортимицин крем и за какво се прилага
2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Кортимицин крем
3. Как се прилага Кортимицин крем
4. Възможни нежелани реакции
5. Условия на съхранение
6. Допълнителна информация

#### Кортимицин крем

Лекарствени вещества в 1g крем: Хидрокортизонов ацетат ( Hydrocortisone acetate) 10mg и Неомицинов сулфат (Neomycin sulphate) екв. на 3.5mg Неомицин (Neomycin)

Помощни вещества: цетомacroгол 1000, цетостеарилов алкохол, течен парафин, бял вазелин, метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, пречистена вода


Кортимицин крем 15 g в двойно лакирани алуминиеви туби

#### Притежател на разрешението за употреба

Активис ЕАД  
ул. "Атанас Дуков " 29  
1407, София България  
България  
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

#### Производител

"Балканфарма-Разград" АД



бул. "Априлско въстание" №68  
Разград-7200  
Тел. 084613318

## **1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОРТИМИЦИН КРЕМ И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА**

Кортимицин крем е комбиниран препарат за локално приложение с изразено антибактериално и противовъзпалително действие.

**Кортимицин крем се прилага за локално лечение на:**

- Алергодерматози - контактен дерматит, вторично инфектирани екземи, строфулус, дерматит от инсекти;
- пруритус ано-генитален;
- невродермит;
- атопичен дерматит;
- псориазис вулгарис;
- ихтиози;
- лихен рубер планус;
- инфектирани рани;
- слънчево изгаряне.

## **2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С КОРТИМИЦИН КРЕМ**

**Кортимицин крем не се прилага при:**


- наличие на свръхчувствителност към някое от активните или помощните вещества;
- туберкулоза на кожата,
- вирусни и паразитни кожни заболявания,
- кожен сифилис,
- гъбични инфекции,
- кожни реакции след ваксинации,
- периорален дерматит,
- акне,
- розацея.

**При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:**

Продуктът не трябва да се прилага продължително прилагане в големи количества и върху обширни площи от кожата поради възможност от резорбция и поява на системни ефекти.

Продуктът се прилага кратко време върху лице и клепачи поради риск от поява на телеангиектазии и пигментации, както и глаукома.

Не се препоръчва употребата му при кърмачета и малки деца, поради риск от повишена резорбция и поява на системни ефекти. Резорбцията е по-изразена при недоносени, отколкото при доносени деца. Лечението в детската възраст не трябва да превишава две седмици при еднократна апликация на ден.



При пациенти в напреднала възраст продуктът се прилага с повишено внимание поради възрастовите промени на кожата.

Препаратът съдържа т. нар. парабени, които могат да причинят забавен тип алергични реакции и по-рядко реакции от бърз тип - уртикарии и бронхоспазъм.

**Приложение на Кортимицин крем и прием на храни и напитки**  
Кортимицин крем е продукт за локално приложение.

#### **Бременност**

*Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт!*

Да се избягва прилагането на продукта при бременни, особено в големи количества и върху обширни участъци за продължително време, поради опасност от системна резорбция.

#### **Кърмене**

*Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт!*

Няма данни за преминаване на препарата в майчиното мляко, но не се препоръчва прилагането му в периода на кърмене.

#### **Шофиране и работа с машини**

Кортимицин крем не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

#### **Приемане на други лекарства**

*Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или сте приемали скоро други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар.*

Кортимицин крем е несъвместим със салицилова киселина, танин, тежки метали.

#### **Данни за помощните вещества**


Съдържанието на парабени (метил и пропил парахидроксибензоат) в Кортимицин крем може да причини уртикария, контактен дерматит и много рядко бронхоспазъм.

### **3. КАК СЕ ПРИЛАГА КОРТИМИЦИН КРЕМ**

*Винаги приемайте Кортимицин крем според инструкциите на лекуващия лекар!*

Кремът е подходящ за третиране на интертригинозни или леко ексудирани области.

Кортимицин крем се прилага локално като се нанася 2-3 пъти дневно на тънък слой върху засегнатите кожни участъци, не повече от един месец.



**Ако сте приели по-голямо количество от лекарството:**

*При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ към лекар!*

Наблюдаваните при предозиране симптоми съвпадат с описаните по-горе нежелани лекарствени реакции, особено при по-продължително лечение и при приложение върху големи площи.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

*Както всеки друг лекарствен продукт, Кортимицин крем може за предизвика нежелани лекарствени реакции*

Локални нежелани реакции: атрофия на епидермиса и дермата, застоен еритем, стероидно акне, телеангиектазии, хипертрихоза, промени в пигментацията на кожата, пурпура, стрии.

Системни нежелани ефекти: Къшинг синдром, стероиден диабет, повишен белтъчен метаболизъм, нарушение в електролитния баланс.

*Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.*

#### **5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ**

При температура под 25<sup>0</sup>С.

Да не се замразява!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност: 3 (три) години

#### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД

ул. "Атанас Дуков " 29

1407, София България

България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – Ноември 2008 г.

