


Б. ЛИСТОВКА



ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

CORYZALIA
КОРИЗАЛИЯ, обвити таблетки



Активни вещества:

За 1 обвита таблетка от 300 mg:

Allium сера	3 СН.....0.333 mg
Belladonna	3 СН.....0.333 mg
Sabadilla	3 СН.....0.333 mg
Kalium bichromicum	3 СН.....0.333 mg
Gelsemium sempervirens	3 СН.....0.333 mg
Pulsatilla	3 СН.....0.333 mg

Помощни вещества:

Захароза, магнезиев стеарат, арабска гума, желатин, талк, бял восък, карнаубски восък.

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Ако имате допълнителни въпроси или съмнения, потърсете повече информация от вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако желаете допълнителна информация или съвет, обърнете се към вашия фармацевт.
- Ако след употреба на продукта оплакванията продължават или състоянието се влоши, обърнете се за съвет към лекар.
- Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка, или отбелязаните нежелани лекарствени реакции станат сериозни, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява **КОРИЗАЛИЯ**, обвити таблетки, и за какво се използва
2. Каква информация трябва да имате преди да приемете **КОРИЗАЛИЯ**, обвити таблетки
3. Как да приемате **КОРИЗАЛИЯ**, обвити таблетки
4. Възможните нежелани реакции
5. Съхранение на **КОРИЗАЛИЯ**, обвити таблетки
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОРИЗАЛИЯ, обвити таблетки, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Обвита таблетка от 300 mg.



Хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван лечение на ринит (хрема) и настинка.

2. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОРИЗАЛИЯ, обвити таблетки

Не приемайте КОРИЗАЛИЯ, обвити таблетки:

Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на КОРИЗАЛИЯ, обвити таблетки.

Обърнете специално внимание при лечението с КОРИЗАЛИЯ, обвити таблетки:

Поради наличието на захароза този медикамент е противопоказан при непоносимост към фруктоза, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захаразно-изомалтазен дефицит (рядко срещани метаболитни заболявания).

Прием на други лекарства

Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КОРИЗАЛИЯ, обвити таблетки?

Перорално приложение.

Възрастни и деца :

По 1 таблетка през час, до 12-тия час. Приемите се разреждат при подобрение.
Таблетката се държи устата до пълното ѝ разтваряне.

Деца под 1 година: таблетката се стрива и разтваря във вода преди прием.

Ако сте приели повече от необходимата доза КОРИЗАЛИЯ, обвити таблетки:

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете КОРИЗАЛИЯ, обвити таблетки:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, КОРИЗАЛИЯ, обвити таблетки, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако забележите неописани в тази листовка нежелани реакции или някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.



5. СЪХРАНЕНИЕ НА КОРИЗАЛИЯ, обвити таблетки

Съхранявайте на място далеч от достъпа и погледа на деца.

Не използвайте **КОРИЗАЛИЯ**, обвити таблетки, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Притежател на разрешението за употреба

Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
France

Производител

Laboratoires BOIRON
2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
France

Дата на последно одобрение на листовката: Юни 2006

Per. N°9600096

