

ИАЛ
ОДОБРЕНОІ
ДАТА 27.09.05г.

Информационна листовка

Прочетете внимателно информационната листовка преди прилагането на лекарствения продукт.

Съхранете тази информационната листовка. Възможно е да се наложи да я прочетете отново.

Ако възникнат допълнителни въпроси, обезателно се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Този лекарствен продукт е предназначен лично за Вас и Вие не трябва да го препоръчвате на други лица без предварителна консултация с лекар. Това може да се окаже вредно за тях, дори при заболяване със същите симптоми.

**DAVERCIN
ДАВЕРЦИН
Гел
2.5%**

Състав

Лекарствено вещество Erythromycin A cyclic 11,12-carbonate 25mg/g

Помощни вещества Диметилсулфоксид, пропилен гликол, етилов алкохол, хидроксипропилцелулоза, изопропилов алкохол,

Опаковка

Даверцин гел 2,5%, 30g, в алюминиеви тубички с мембрана, пръстен и полиетиленова капачка. Всяка тубичка заедно с информационна листовка се опакова в индивидуална кутийка с всички необходими означения.

Име и адрес на производителя и притежателя на регистрацията

Tarchomin Pharmaceutical Works Polfa S.A.

2, Fleminga Str.

03-176 Warsaw

Poland

Тази листовка съдържа информация за Даверцин гел:

1. Какво представлява и за какво се прилага?
2. Преди приложението...
3. Как се прилага?



4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение
6. Друга информация

1. Какво представлява и за какво се прилага Даверцин гел?

Еритромицин се отнася към макролитните антибиотици. Бактериостатичното му действие се проявява чрез потискане белтъчния синтез в бактериалната клетка. Еритромицин е активен срещу большинството Грам (+) и някои Грам (-) бактерии. Проявява активност и срещу *Propionibacterium acnes* – анаеробен Грам (+) причинител на акне.

Даверцин гел, приложен локално, практически не се абсорбира в циркулацията на кръвта и не проявява системни ефекти.

Показания за приложение

Локално лечение на акне.

2. Преди приложението...

Да не се започва лечение с Даверцин гел при свръхчувствителност към еритромицин, други макролитни антибиотици и към останалите компоненти на продукта.

Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

- Да се прилага само върху кожата
- Да не се прилага върху очите
- Да се избягва контакт с очите и лигавиците.

Бременност и кърмене

Да се използва по време на бременност само при категорична необходимост.

Да се прилага с особено внимание при кърмачки, поради отсъствие на данни за преминаване в кърмата при локално приложение.

Обърнете се за съвет към Вашия лекар или фармацевт, преди лечение с Даверсин при бременност или кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Не се наблюдава ефект върху способността за шофиране и работата с машини.

Лекарствени и други взаимодействия

Едновременно локално приложение с други лекарствени продукти може да доведе до кумулиращ възпалителен ефект.

Информирайте Вашия лекар за всички лекарствени продукти, които употребявате. Ако приемате регулярно други продукти е важно да следвате лекарските инструкции за тяхното приложение. Това се отнася както за тези по лекарско предписание, така и за продаваните без рецептa.



3. Как се използва Даверцин гел?

Прилага се в тънък слой върху увредената кожна повърхност два пъти дневно-сутрин и вечер.

Продължителност на приложението средно 6- 8 седмици.

Да се измиват ръцете след всяка апликация.

Ако Вие се стори, че действието на продукта е много силно или слабо консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Ако Вие или някой друг използва по-висока от предписаната доза..

Не е наблюдавано предозиране при локално приложение.

Въпреки това, ако Вие или някой друг приложи по-висока доза от предписаната, консултирайте с лекар.

Ако пропуснете доза...

Ако пропуснете доза, приложете продукта, когато си спомните. Продължете по предписаната програма, ако е наблизило време за следващо аплициране. Не удвоявайте за да компенсирате пропусната доза.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции

Наблюдават се рядко.

Най-често- парене, възможни са бодежи, суха и лющеща се кожа, зачервяване. Дразнене на очите е наблюдавано при приложение върху кожата на лицето. Възможно е развитие на резистентност.

Ако почувствате някоя от гореизброените нежелани лекарствени реакции, прекъснете прилагането на продукта и незабавно се обърнете към лекуващия Ви лекар.

Ако наблюдавате друга неописана по-горе нежелана реакция, която свързвате с прилагането на продукта също се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Даверцин гел?

Да се съхранява под 25° С.

Да се съхранява в добре затворени тубички. Да се пази от светлина и влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

6. Друга информация

- Срок на годност

2 години.

Срок на годност след отваряне на опаковката – 6 мес.

Преди употреба на продукта, проверете срока на годност върху опаковката.

Не употребявайте след изтичане срока на годност.

- Ако имате въпроси, моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
- Дата на последна редакция

Септември , 2005

