

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 25.06.2002

RGD: 56272/E/3
23.09.2002

ДЕКАРИС (DECARIS)
таблетки 150 mg

Моля, прочетете листовката внимателно, преди да започнете да приемате лекарството.

*Какво представлява таблетката Декарис 150 mg и за какво се използва?
Активната съставка във всяка таблетка на лекарството е 150 mg levamisole.
Други съставки: магнезиев стеарат, повидон, талк, захароза, лактоза, ниншесте.*

Таблетката Декарис 150 mg е противоглистно средство, което се използва за лечение на възрастни.

*Кога не трябва да се приема таблетка Декарис от 150 mg?
Таблетката Декарис 150 mg не трябва да се използва за лечение на деца!
Също така да не се приема в случай на известна съръхчувствителност към активното вещество или помощните съставки на лекарството.
Таблетка Декарис от 150 mg не трябва да се приема в период на кърмене.
По време на бременност може да се приема само по изключение, по указания на лекаря.
Едновременната употреба на други лекарства може да окаже влияние върху ефекта на таблетката Декарис 150 mg, ето защо в такъв случай трябва да се посъветвате с Вашия лекар.*

*Как трябва да се приема таблетката Декарис 150 mg?
Таблетката Декарис 150 mg трябва да се приема по указания на лекаря, в дозировка по лекарско предписание.
Таблетката трябва да се приема с малко вода, след хранене, за предпочтение вечер.
В случай, че не е предписано друго, обикновено дозата е 1 таблетка, която се приема еднократно.
За изхвърляне на паразитите е достатъчна еднократна доза, лечението може да се повтори само по указания на лекаря.
По време на лечението не е необходимо прилагането на очистителни средства или специална диета.*

Предупреждения

*Преди и след приемане на лекарството е забранена употребата на алкохол в продължение на 24 часа!
Таблетка Декарис 150 mg не трябва да се приема едновременно с лиофилни продукти (тетрахлорметан, тетрахлоретилен, хеноподиево масло, хлороформ или етер).
Ако след употреба на лекарството, по време на следващите седмици се появят главоболие, слабост в крайниците, повишена отпадналост или разсейност, незабавно трябва да се консултирате с Вашия лекар.*

Едновременната употреба с други лекарства, като антикоагуланти, лекарства, влияещи върху хемопоезата (кръвообразуването), фенитоин, може да повлияе ефекта на таблетката Декарис 150 mg, поради това е необходимо да се обърнете към лекаря за съвет в такива случаи.

Кои са възможните нежелани реакции на таблетката Декарис 150 mg и какво трябва да се направи, ако се появят?

След приемане на таблетката е възможно да се появи гадене, повръщане, болки в корема, диария или главоболие.

Ако след употреба на лекарството, по време на следващите седмици се появят главоболие, слабост в крайниците, повишена отпадналост или разсейност, независимо трябва да се консултирате с Вашия лекар.

В редки случаи е възможна появата на безсъние, замайване, сърцевиене, гърчове.

Рядко могат да се появят грипоподобни симптоми и покачване на температурата.

При курсово лечение е наблюдавано нарушение в кръвотворната система, ето защо е необходим постоянно контрол на кръвната картина.

Как трябва да се съхранява таблетката Декарис 150 mg?

Да се съхранява под 25° C.

Не използвайте лекарството след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.

Винаги пазете лекарството на място, недостъпно за деца.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Производител

Гедеон Рихтер АД

Будапеща - Унгария

По лиценз на Janssen Pharmaceutica N.V.

Beerse, Belgium

Дата на последна редакция: