

Информация за пациента

Deep Heat Spray

Дийп Хийт Спрей

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №:	Н-2239, 10.06.08
Одобрено: N=5/17.12.2007	

СЪСТАВ: *Лекарствени вещества:* метил никотинат (methyl nicotinate) 1.6%, 2-хидроксиетил салицилат (2-hydroxyethyl salicilate) 5%, метил салицилат (methyl salicylate) 1%, етил салицилат (ethyl salicylate) 5%; *Помощни вещества:* изопропил алкохол 27.4%, бутан 40-60%.

Лекарствена форма: спрей за кожно приложение 150 мл, опаковка под налягане

Производител и притежател на разрешението за употреба:

The Mentholatum Company Ltd.
1 Rdwood Avenue
Peel Park Campus
East Kilbride, G74 5 PE

Начин на действие: Локално приложението Дийп Хийт Спрей действа болкоуспокояващо и противовъзпалително.

Показания: За симптоматично локално облекчаване на болки и възпаления на скелетномускулния апарат (бурсити, тендинити, фиброзити, ишиас, лумбаго, дисторзио).

Противопоказания:

- При свръхчувствителност към някоя от лекарствените или помощните съставки.
- Да не се прилага върху наранена и възпалена кожа.

Специални предпазни мерки при употреба:

Само за външна употреба върху здрава кожа!

- Избягвайте контакт с очите.
- Не вдишвайте препарата.
- Пазете лицето когато пръскате врата или раменете
- Винаги използвайте малки количества, тъй като прекомерната употреба може да причини дискомфорт, особено при пациенти с чувствителна кожа.
- Да не се прилага при деца под 5 годишна възраст.
- Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Ако симптомите продължават, консултирайте се с Вашия лекар.



Лекарствени и други взаимодействия:

Да се избягва едновременната употреба с други нестероидни противовъзпалителни средства.

Дийп Хйт Спрей да се прилага с повишено внимание при астматици, при които аспиринът или други нестероидни противовъзпалителни препарати могат да предизвикат астматични пристъпи, ринити или уртикария.

Бременност и кърмене: Приложението на Deep Heat Spray при бременни и кърмачки трябва да се избягва.

Не се препоръчва употребата на Deep Heat Spray за деца под 5 години!

Ефект върху способността за шофиране и работа с машини: Няма

Дозировка и начин на приложение: Разклатете добре флакона преди употреба! Насочете спрея към определеното място като го държите на разстояние от около 15-20 см от кожата. Прилага се 2-3 пъти дневно (2-3 кратки впръсквания са достатъчни). Масаж не е необходим.

Предозиране: Малко вероятно поради локалното приложение на препарата.

Нежелани лекарствени реакции: Възможни са кожни реакции на мястото на приложение (обриви, сърбеж, затопляне, уртикария). В тези случаи употребата му се прекратява.

Специални условия на съхранение: Да се пази от пряка слънчева светлина и да се съхранява на температура под 50°C.

Срок на годност: 5 години. Да не се използва след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опаковка под високо налягане! Не пробивайте и не изгаряйте дори когато е празна. Не впръскайте в огън или друг запалим материал.

ЛЕСНО ЗАПАЛИМО!

Дата на последна редакция на текста на листовката: 14.03.2002 год.

