

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Дийп Рилийф 5 %/3 % гел - 50 г
Ибупрофен / Легоментол
Deep Relief 5 %/3 % gel - 50 g
Ibuprofen / Levomenthol

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-2124 / 22.05.08
Одобрено: № 3/21.04.2008

СЪСТАВ

Активни вещества: Ибупрофен (*Ibuprofen*) 5%, Легоментол (*Levomenthol*) 3%

Помощни вещества: пропилен гликол, карбомер, ди-изопропаноламин карбомер, ди-изопропаноламин,

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Гел за приложение върху кожата

ДЕЙСТВИЕ

Дийп Рилийф е прозрачен, безцветен гел за локално приложение, който успокоява болката и има противовъзпалително действие. Съдържа Ибупрофен, който е от групата на нестероидните противовъзпалителни средства (NSAIDS) и осигурява ефективно и дълготрайно облекчение на болката, намалява възпалението и отока. Легоментол има охлаждащ ефект и осигурява допълнително облекчение на болката. Съставът на гела с двойно действие позволява бърза и концентрирана абсорбция на активните вещества през кожата на мястото на болката. Резултатът от комбинацията на Ибупрофен и Легоментол, заедно с помощното вещество ди-изопропаноламин е незабавно и дълготрайно облекчаване на болката

ПОКАЗАНИЯ

За симптоматично облекчаване на ревматични и мускулни болки и възпаление при изкълчвания, навяхване и спортни травми.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Свръхчувствителност към някои от активните съставки или ексципиенти. Гелът е противопоказан при пациенти с астма, при които аспириновият или нестероидните противовъзпалителни средства предизвикват астматични пристъпи, ринити или уртикария.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Само за външна употреба върху здрава кожа!
- Да не се нанася върху отворени рани, възпалена или наранена кожа!
- Да не се нанася в близост до очите!
- Да не се използва с оклузивни превръзки!
- Ръцете трябва да се измиват след нанасянето на продукта.
- Да се прекрати употребата на гела, ако кожата или болното място е силно раздразнено!
- При поглъщане на гела, пациентът трябва веднага да се свърже с лекар от най-близката спешна медицинска помощ!
- Да не се използва от деца под 12 години!
- Да се съхранява на място, недостъпно от деца!

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Избягвайте едновременната употреба с аспирин или други нестероидни противовъзпалителни средства.

Не излагайте на слънчева светлина третиранията област веднага след нанасяне на гела.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Бременните жени и кърмачките трябва да избягват употребата на Дийп Рилийф гел.

ЕФЕКТ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Локалното приложение на Дийп Рилийф гел не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ/

Възрастни и деца над 12 години.

Дийп Рилийф гел се нанася върху засегнатата зона с леки масажни движения до пълното му попиване. Апликацията се повтаря, но не повече от 3 пъти дневно. Да не се нанася на интервали по-малки от 4 часа. За всяка апликация се използва 1-4 см от гела.

Гелът е подходящ за употреба по време на физиотерапевтични процедури (ултразвук, йонофореза).

Ако след две седмици не настъпи подобрене, задължително се провежда консултация с лекар.

ПРЕДОЗИРАНЕ

Предозирането е малко вероятно поради локалното приложение на препарата.

Симптомите от предозиране на ибупрофен включват главоболие, повръщане, сънливост и хипотензия.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Възможни се кожни реакции на мястото на приложение (обриви, сърбеж и уртикария), както и стомашни проблеми (стомашни болки, диспепсия).

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява под 25°C.

СРОК НА ГОДНОСТ

3 години.

Да не се използва след датата посочена на опаковката.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ

Mentholatum Company Ltd,

1 Redwood Avenue, Peel Park Campus, East Kilbride, G74 5PE, Великобритания

Дата на последната редакция на листовката: 12.05.2008г.

