


ИАЛ  
ОДОБРЕН ОI  
ДАТА 05.12.06

**УКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБА**

## Dermodrin Ointment Дермодрин маз

Diphenhydramine hydrochloride



### Състав

1g маз съдържа 20mg Diphenhydramine hydrochloride и помощни вещества: метил-пара-хидроксибензоат 0,0015g, фъстъчено масло, избелен восък, цетилов алкохол, твърг парфин, бял вазелин, глицерол, цетеарепт-3, полисорбат 80, изборнилов ацетат, натриев хидроксиг, пречистена вода.

### Лекарствена форма

Охлаждаща антисхистаминова маз за приложение върху кожата.

### Големина на опаковките

20g, 50g, 100g.

### Начин на действие

Дифенхидрамин хидрохлорид, активното вещество на Дермодрин е изпитано антисхистаминово и антиалергично средство против сърбеж и за локално облекчаване на болката при аларии и кожни заболявания. Той е подходящ и за употреба при ужилвания от насекоми, леки изгаряния и сънчева алергия както и при кожни реакции на свърхчувствителност.

Дермодрин маз като емулсия мазнина във вода действа приятно охлаждащо, като с това облекчава допълнително болката. Предизвиква намаление на алергичните отоци на кожата или ги предотвратява.

Дермодрин маз е предназначен само за външно приложение.

Кремообразната форма, без мирис, недразненча се втича лесно и се разпределя върху кожата. Ефектът се получава скоро след насянето и продължава 2-6 часа.

### Примеждамел на разрешение за употреба

Pharmazeutische Fabrik MONTAVIT GesmbH.  
A-6060 Absam/Tirol, Austria.

### Показания

Дермодрин маз е показан за лечение на сърбеж, локални болки и реакции на свърхчувствителност на кожата при:

- дерматити, уртикарал, сърбеж, екземи, сърбящи ръбове на рани и лъщени;
- ухапвания от насекоми;
- леки изгаряния, сънчево изгаряне;
- сърбящи обриви на кожата след излагане на сънчева светлина (сънчева алергия).

### Противопоказания

Свърхчувствителност към дифенхидрамин хидрохлорид, към други антисхистаминови средства или към някоя от помощните съставки на лекарствения продукт.

Дермодрин маз не трябва да се прилага при новородени и деца под 2 години.

Дермодрин маз не трябва да се нанася върху отворени рани или лигавици, освен това не трябва да се използва при кожни изменения с голяма повърхност, като възпалена и наранена кожа особено при пациенти с Варicела, морбили и мехури по кожата.

### Бременност и кърмене

Дермодрин маз не трябва да се използва в първия тримесец на бременността. По време на останалия период от бременността употребата върху големи повърхности трябва да се избягва, особено върху възпалена и наранена кожа.

Дермодрин маз не трябва да се употребява по



Време на кърмене, тъй като активното вещество (сифенхидрамин) преминава в кърмата.

#### Предпазни мерки при употреба

Продуктът не трябва да влиза в контакт с очите.

Третираните места на кожата не трябва да се излагат продължително на слънчева светлина, тъй като може да се появят възможни реакции на свръхчувствителност към светлина.

При устойчивост на оплакванията или когато не се получава очаквания успех на лечението се препоръчва да се потърси съвет от лекар. Да се съхранява далеч от погледа и досътапа на деца!

#### Лекарствени взаимодействия

Досега не са наблюдавани взаимодействия с други лекарствени продукти след употреба на Дермодрин маз.

При приложение върху големи повърхности не може да се изключат възможни взаимодействия, затова моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате и други лекарствени продукти.

#### Дозировка и начин на приложение

Ако лекарят не е предписал друго, нанесете според големината на третираното място, количество с големината на череша до орех от Дернодрин маз (съответстващи на 1-3g) върху засегнатото място на кожата.

Възрастни: нанесете 4-6 пъти дневно. Деца: само 4-5 пъти дневно.

Когато оплакванията не се подобряват след 4-5

седмиична непрекъсната употреба, трябва да уведомите Вашия лекар.

Досега няма съобщения за предозиране на Дермодрин маз. При погъщане на Дермодрин маз, обрънете се незабавно към лекар.

#### Нежелани лекарствени реакции

Дермодрин маз се понася много добре.

Рядко може да се появи сърбеж, зачервяване, образуване на мехури, отоци, алергични кожни реакции и засилена чувствителност към слънчева светлина (да се избягва директно излагане на слънце).

Съобщава се за единични случаи на реакции на свръхчувствителност, кожни обриви и състояния на възбудимост (безпокойство, спазми) особено при деца. В такива случаи трябва да преустановите лечението и да уведомите веднага Вашия лекар.

Моля, обрънете се към Вашия лекар или фармацевт, ако забележите оплаквания по време на лечението с Дермодрин маз, които не са описани в тези указания за употреба.

#### Срок на годност и начин на съхранение

Следвайте срока на годност, означен върху опаковката и не я използвайте след тази дата. Съхранява се под 25°C.

#### Последна редакция на текста

Декември 2006

При неясната потърсете специализирана консултация.



## Dermodrin Ointment Дермодрин маз

