

14

ЛИСТОВКА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №: 11-1262, 20.03.08	
Одобрено: 10/ 18.12.07	

Преди да вземете лекарството, внимателно прочетете цялата тази листовка.

- Пазете тази листовка. Може до се наложи да я прочетете отново
- Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт
- Това лекарство е предписано на Вас и Вие не трябва да го давате на други хора. То може да им навреди, дори и симптомите, които имат да са като Вашите.

В тази листовка:

1. За какво се използва Диабрезид
2. Преди да вземете Диабрезид
3. Как да взимаме Диабрезид
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Съхраняване на Диабрезид

**DIABREZIDE 80 mg tablets**

Диабрезид 80 мг таблетки

Gliclaside/ гликлазид

Лекарственото вещество е гликлазид

Другите съставки са: лактозаmonoхидрат, микрокристална целулоза PH101, повидон K30, натриев карбоксиметил нишесте тип A, магнезиев стеарат.

Притежател на разрешението за употреба

И Производител:

L.Monteni & C.dei F.Ili Alitti Societa di Esercizio S.p.A., SS 67, Localita Granatieri, Scandicci, Firenze, Italy

**1. Какво представлява Диабрезид и за какво се използва?**

Името на Вашето лекарство е Диабрезид

Диабрезид са бели, кръгли пресовани таблетки с плоско изгладен ръб и делителна черта от едната страна.

Te се предлагат в кутии по 40 бр.

Диабрезид е сулфанилуреен препарат и се прилага за лечение на захарен диабет тип 2, също със съдови усложнения.

**2. Преди да вземете Диабрезид**

Диабрезид не трябва да се приема:

- от бременни



- от жени, които кърмят
- за лечение на деца диабетици
- от диабетици, на които им предстои операция, след травма или тежка инфекция
- от диабетици с тежки чернодробни и бъбречни заболявания
- ако сте свръхчувствителен /алергичен/ към лекарственото вещество гликлазид или към някоя от другите съставки на Диабрезид

Ако някоя от тези ситуации е валидна за Вас или имате въпроси или се колебаете дали да приемате Диабрезид, Вие трябва да се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

#### *Особено внимавайте с Диабрезид:*

Както при всяко лечение на захарен диабет, Вашето ниво на захар в кръвта може да стане много ниско при намаляване приема на храна. Ако имате инфекция, опериран сте или сте претърпели тежко нараняване, уведомете Вашия лекар, че приемате Диабрезид.

Важна информация за някои от съставските на диабрезид. Диабрезид съдържа лактоза. Ако сте били уведомени, че имате непоносимост към някои видове захари, обърнете се към Вашия лекар преди да вземете това лекарство.

#### **Прием на Диабрезид с храна и течности**

Приемът на алкохол може да измени лечението на диабета.

#### **Шофиране и използване на машини**

Вашата концентрация и от там възможността да шофирате или използвате машини може да се повлияе, ако вашият диабет не се контролира задоволително. Страйте се да избягвате понижаването на кръвната захар, когато шофирате.

#### **Прием на други лекарства**

Лечението на Вашия диабет с Диабрезид може да се повлияе от широка гама лекарства, които могат да Ви бъдат предписани или можете да закупите от аптеката.

Някои лекарства могат да усилят ефекта на Диабрезид като резултат от намаляването на кръвната захар. Това са други лекарства за лечение на диабет, противовъзпалителни препарати, лекарства за намаляване на съсирането на кръвта, лекарства против гъбички и бактериални инфекции, лекарства, които повлияват нивото на холестерола, лекарства за астма, някои антидепресанти, някои лекарства за лечение на високо кръвно налягане.

Някои лекарства могат да отслабят ефекта на Диабрезид като резултат от увеличаване на кръвната захар. Те включват: кортикоステроиди, орални контрацептиви, лекарства за повишаване на кръвното налягане при някои случаи на ниско кръвно налягане, диуретици.

Много важно е да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземате някакви други лекарства.

#### **Как да вимаме Диабрезид**



**Винаги приемайте Диабрезид така, както Ви е инструктиран лекаря.**  
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако се чувствате несигурни.  
Общата дневна доза може да варира от половин до 4 таблетки , в зависимост от  
отговора на лечението и тя се определя и преценява от Вашия лекар.  
Обичайната средна дозировка е 1-2 таблети, разделени на две дози, приети  
преди закуска и преди вечеря.  
Таблетките трябва да се гълтат с чаша вода за предпочтение 30 минути преди  
хранене.  
Лечението на диабета обикновено е пожизнено.

#### ***Ако вземете повече Диабрезид, отколкото е необходимо***

В случай на предозиране, незабавно се обадете на Вашия лекар или в най-  
близката болница - спешно отделение. Симптомите, които могат да се очакват  
при предозиране са тези на намаляване нивото на кръвната захар (внезапно  
изпотяване, пребледняване, трепор, сърцебиене, преходно смущение в говора и  
зрението). И може да се овладеят с прием на глюкоза или сладки напитки. С  
оглед на това, е препоръчително винаги да носите със себе си 1-2 бучки захар.

#### **Ако забравите да вземете Диабрезид**

Ако забравите да вземете една или повече дози, то вземете една доза веднага  
щом се сетите и след това продължете приема според предписанието. Не  
вземайте двойна доза.

#### **Възможни нежелани лекарствени реакции**

За съжаление всички лекарства могат да имат нежелани лекарствени реакции.  
Диабрезид не е по-различен. Диабрезид, приложен в обичайна дозировка, може  
да предизвика нежелани реакции у някои хора. Това включва: гадене, коремна  
болка, диария/запек, главоболие, световъртеж, кожни обриви, намаляване броя  
на кръвните клетки, както на червените кръвни телца /анемия/, така и на белите  
/ левкопения, гранулоцитоза/, и на тромбоцитите /тромбоцитопения/. Анемията  
може да провокира умора и световъртеж; левкопенията и агранулоцитозата  
могат да провокират неочаквани инфекции и температура; тромбоцитопенията  
може да се прояви със синими и продължително кървене. Всички тези  
изменения могат да се докажат с изследвания на кръвта. Ако се наблюдава  
някой от описаните по-горе симптоми по време на лечението, незабавно се  
обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

#### **Съхраняване на Диабрезид**

Да се пази на недостъпни за деца места  
Да не се съхранява при температура над 25C  
Да не се използва след изтичане срока на годност, отбележан на външната страна  
на опаковката.

Тази листовка е одобрена / актуализирана на:  
април 2002

