

Скъпи пациенти,



Моля, прочетете тази листовка внимателно, преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси или съмнения, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Запазете упътването за употреба, може да искате да го прочетете по-късно.

1. Име на лекарствения продукт

Dioket

Диокет

2. Състав на лекарствения продукт

Една таблетка съдържа: 600 mg diosmin.

Помощни вещества: повидон, микрокристална целулоза, царевично нишесте, магнезиев стеарат

Една таблетка е 720 mg.

3. Предлагана форма и съдържание

Опаковка с 30 таблетки

4. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

Stragen France SAS

1 rue des Quatre Chapeaux

F-69002 Lyon

Франция

5. Име и адрес на производителя на лекарствения продукт

Weimer Pharma

Im Steingerust 30

D-76437 RASTATT

Германия



6. Какво представлява diosmin и при какви състояния се използва?

Този лекарствен продукт е от групата на венотоничните лекарствени продукти. Той се прилага при венозна недостатъчност: тежест в краката, болка, оплаквания при начален декубитус и хемороидални кризи при възрастни пациенти.

7. Какви предпазни мерки трябва да следвате преди да приемате diosmin?

Потърсете лекарска помощ, ако проблемите и съдовата чувливост не намалеят след 15 дневно лечение. Този продукт има пълна ефективност, ако се комбинира със здравословен начин на живот. Избягвайте да се излагате на слънце или на топлина, както и да стоите прави и да натрупате свръхтегло. Разхождайте се и по възможност носете подходящи чорапи, които да подобрят Вашето кръвообращение.

При обострени хемороиди – прилагането на този продукт не отменя специфичното лечение на други заболявания на правото черво. Лечението трябва да бъде краткотрайно, не повече от 15 дни. Ако не се отстранят бързо симптомите на обострените хемороиди или състоянието се влоши, трябва да се направи проктологична оценка и лечението да се ревизира.

Ако имате допълнителни въпроси или съмнения, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

8. Взаимодействия с други лекарства и други форми на взаимодействие

За да се избегнат възможни взаимодействия с други лекарствени продукти, информирайте системно Вашия лекар или фармацевт за всеки друг лекарствен продукт, който приемате едновременно.

9. Бременност и кърмене

Избягвайте да приемате този лекарствен продукт по време на бременност, без да сте се консултирали с Вашия лекар.

Ако по време на приема на този лекарствен продукт установите, че сте бременна, потърсете лекарска консултация, защото само Вашия лекар може да реши дали е необходимо да продължите лечението.

Поради липса на данни дали диосмин се екскретира в ~~човешката~~ кърма, не се препоръчва кърмене по време на лечение.



10. Как трябва да приемаме този лекарствен продукт?

При циркулаторни проблеми: една таблетка дневно, сутрин, преди закуска.

При хемороидална криза: 2 - 3 таблетки дневно, по време на хранене.

Начин на приложение: перорално

11. Честота на приложение и кога лекарството трябва да се прилага?

При всички случаи следвайте предписаното от Вашия лекар.

12. Продължителност на лечението

При всички случаи следвайте предписаното от Вашия лекар.

13. Какво трябва да направите в случай на предозиране?

Информирайте Вашия лекар веднага.

14. Какви нежелани реакции са възможни?

Както всички лекарствени продукти, този лекарствен продукт може да има нежелани реакции.

Възможна е проява на свръхчувствителност към някоя от съставките на лекарствения продукт.

Вероятността от възникването на проблеми с храносмилането рядко може да доведе до прекъсване на лечението.

15. Какви условия са необходими за съхранението на този лекарствен продукт.

Срок на годност: 3 години

Не използвайте този продукт след изтичане срока на годност отбелязан върху картонената кутия.

Таблетките да се съхраняват на недостъпно за деца място.

Актуализация на информацията: Ноември 2008

