

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 23.09.03г.

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Duotox® tablets 250, 375, 500, 750 и 1000 mg
Дуомокс таблетки 250, 375, 500, 750 и 1000 мг

Какво трябва да знаете за Duotox таблетки?

Вашият лекар е решил да Ви предпише Дуомокс таблетки, защото смята, че това е най-добрият начин за лечение на настоящото Ви състояние. Подходящото лечение е много важно, но също така важен е и начинът на употреба. Затова прочетете внимателно указанието за употреба, преди да започнете да приемате този лекарствен продукт. Прочетете го също и ако се грижите за болен, преди да му дадете първата доза. Трябва да спазвате указанията на Вашия лекар или зъболекар. Ако имате въпроси или не сте сигурни в нещо, моля обърнете се към специалиста, предписал лекарствения продукт.

Наименованието на Вашия лекарствен продукт е Duotox (Дуомокс)

Какво съдържа Duotox и как действа?

Duotox таблетки съдържа Amoxicillin – антибиотик от групата на пеницилините. Може да се предписва за лечение на бактериални инфекции като: инфекции на дихателните пътища, пикочо – полови инфекции, stomашно – чревни инфекции, инфекции на кожата и меките тъкани.

Кога не трябва да се приема Duotox ?

- Duotox не трябва да се приема при алергия към амоксицилин и други β – лактамни антибиотици, както и към която и да е съставна част на продукта.
- Пациентите с инфекциона мононуклеоза и лимфолевкоза не трябва да се лекуват с Duotox

Какво трябва да имате предвид за Duotox?

- Ако сте бременна (или смятате, че сте) или кърмите, моля съобщете това на Вашия лекар (зъболекар) преди да започнете да приемате това лекарство.
- Duotox таблетки се приемат много лесно. Те могат да се погълнат цели или да се разчупят на половинки, с глътка вода (около четвърт чаша), или могат да се разтворят в малко количество вода и да се изпият. По този начин се избягват проблеми при погълдането.
- Duotox таблетки са с много приятен вкус и се приемат с удоволствие от възрастни и деца. Те, разбира се, не са бонбони и трябва да се съхраняват на недостъпни за деца места.
- Duotox таблетки не съдържат захар и натриев хлорид и могат да се приемат и от диабетици, както и от пациенти с високо кръвно налягане.
- Важно е да спазвате винаги указанията на Вашия лекар или зъболекар. Трябва да вземате предписания брой таблетки всеки ден и да завършите пълния курс на лечение. Не спирайте приема им ако сте се почувствали по-добре.
- Както и всички други лекарствени продукти, Duotox таблетки може да предизвика нежелани реакции (допълнителна информация за тях е дадена в друга точка от това указание).
- Не е описан ефект върху способността за шофиране и работа с машини.

Преди да започнете приема на този медикамент

Алергични ли сте към пеницилин?



Ако сте алергични към пеницилин (или смятате, че сте), не употребявайте Duotox таблетки. Съобщете това на специалиста, предписал лекарството; той може да реши да Ви предпише друго лекарствено средство.

Препоръчва се повищено внимание при пациенти с данни за проявена алергия към антибиотици или други лекарства. При проява на алергична реакция прекъснете приема на Duotox и се обърнете към Вашия лекар или зъболекар.

Бременна ли сте?

Ако сте бременна (или смятате, че сте) или ако кърмите, съобщете това на Вашия лекар или зъболекар преди да започнете лечението.

Duotox може да се прилага по време на бременност и кърмене, ако Вашият лекар е преценил, че ползата надхвърля възможния рисък за плода или кърмачето.

Както и при други широкоспектърни антибиотици при лечение с Duotox е възможно да се развие т. нар. псевдомембранозен колит. При проява на тежка диария трябва да се прекрати приема на антибиотика и да се обърнете към Вашия лекар.

Как да приемате този лекарствен продукт ?

Какво количество трябва да приемате и колко често?

За да се получи желаният ефект от лечението с Duotox таблетки, е важно да спазвате указанията на Вашия лекар (или зъболекар) и да четете и етикета.

По възможност приемайте Duotox таблетки разпределени на най-равномерни интервали. Може да ги вземате преди, след и по време на хранене, освен ако Вашият лекар или зъболекар не е предписал друго. Ако не сте сигурни за нещо, обърнете се към този, предписал лекарствения продукт, който би могъл да Ви помогне.

Какво трябва да имате предвид, ако сте забравили един прием?

Ако сте забравили един прием, веднага щом си спомните, вземете предписаната доза и след това продължете както преди, но не и в интервал пократък от 1 час между двете дози.

Какво трябва да се направи, ако сте взели по-голяма доза?

Ако случайно сте взели по-голяма доза, съобщете това веднага на Вашия лекар или фармацевт.

Колко дълго трябва да приемате Duotox таблетки?

Приемайте всеки ден предписания брой Duotox таблетки, докато завършите пълния курс на лечение. Не прекратявайте приема, ако се чувствате по-добре. Ако прекратите лечението по-рано отколкото е необходимо, състоянието Ви може да се влоши. Ако оплакванията Ви продължат в края на предписания курс на лечение, трябва да съобщите това на специалиста, предписал лечението.

Взаимодействие с други лекарствени продукти:

- Пробенецид и някои нестероидни противовъзпалителни средства (индометацин, ацетилсалцилова киселина) може да повишат концентрации на амоксицилин
- Едновременното приемане с алопуринол може да провокира проява на кожни обриви, въпреки че няма данни за увеличаване риска от появлата на кожни реакции при приема на алопуринал, както при прием на ампицилин.



- Бактерицидният ефект може да бъде неутрализиран при едновременен прием с тетрациклини, макролиди и хлорамфеникол
- Вашият лекар трябва да бъде информиран за приемането на други лекарствени средства

След приемане на Duotox таблетки

Какви нежелани ефекти могат да настъпят след приемане на Duotox таблетки?

- Стомашно – чревни - диария, гадене, повръщане
- Обикновено тези симптоми са леки. Рядко може да се появи тежка диария с кървави изпражнения.
- Покачване на чернодробните ензими
- Алергични реакции – кожни обриви, алергичен оток, алергичен шок
- Промени в кръвната картина

При поява на нежелани реакции спрете приема и незабавно се свържете с Вашия лекар или зъболекар.

Съхранение

Как да се съхраняват Duotox таблетки

Съхранявайте ги в сухо място, недостъпно за деца, при температура под 30⁰C. Помните: този лекарствен продукт е предписан за Вас от лекар или зъболекар. Не го давайте на друг, дори и оплакванията му да са подобни на Вашите, то може да има вредно влияние.

Да не се употребява след изтичане срока на годност.

Състав на Duotox таблетки:

Лекарствено вещество – amoxicillin trihydrate, съответстващ на 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg amoxicillin.

Помощни съставки – есенция мандарина и лимон, ванилия, захарин, магнезиев стеарат, диспергираща се целулоза, микрокристална целулоза, кросповидан.

Повече информация за Duotox таблетки

Това указание за употреба Ви дава само най-важната информация за Duotox таблетки. Ако имате въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар, зъболекар или аптекар.

Логото Duotox и Yamanouchi Europe B.V. са търговски марки.

Производител: Yamanouchi Europe B.V.

Leiderdorp, The Netherlands

Дата на последна редакция: м.декември 2002 г.

