

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №: 11-1634, 16.04.08	
Одобрено: 13/26.01.08	

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Dusodril® 200 mg film-coated tablet

Дузодрил 200 мг филмирани таблетки

Състав

1 филмирана таблетка съдържа активна съставка 200 mg нафтидрофурил хидроген оксалат.

Помощни съставки

Еудражит RSPO, компритол 888, лактоза, талк, магнезиев стеарат, Еудражит NE 30D, хипромелоза, макрогол 4000.

Лекарствена форма и големина на опаковката

Опаковка от 20 бр. Филмирани таблетки

Фармакотерапевтична група

Периферен вазодилататор.

Производител

Famar Lyon

29 Avenue Charles de Gaulle – 69230 Saint-Genis Laval, Франция

Притежател на разрешението за употреба

Merck Sante s.a.s.


37, rue Saint Romain

69379 Lyon CEDEX 08, Франция

Кога трябва да се използва този лекарствен продукт

Този лекарствен продукт се препоръчва в случаи на:

- болезнено проявен артериит (артериално заболяване на долните крайници, водещо до болезнени спазми на мускулите при ходене);
- нарушения на паметта и вниманието при пациенти в напреднала възраст, с изключение на болестта на Алцхаймер;
- синдром на Рейно (циркулаторно нарушение на крайниците).



Този лекарствен продукт НЕ ТРЯБВА да се използва при следните случаи:

- известна от миналото алергия към нафтидрофурил или към някоя от помощните му съставки;
- доказано повишение на наличието на някои кристали (оксалати) в урината;
- рецидивиращи камъни в бъбреците (съдържащи калций).

АКО ИМАТЕ НЯКАВИ СЪМНЕНИЯ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

Специални предупреждения:

Поради наличието на лактоза, това лекарство е противопоказано в случай на вродена галактоземия, синдром на глюкозо-галактозна малабсорбция или лактазен дефицит (редки метаболитни заболявания).

Предупреждения при употреба

Приемането на този лекарствен продукт без течност преди лягане, може да доведе до увреждане на хранопровода. Затова е важно капсулата да се приема винаги с голяма чаша вода.

Този лекарствен продукт съдържа 38 mg оксалат във всяка таблетка от 200 mg , което при някои хора може да доведе до образуване на камъни в бъбреците.

Затова се препоръчва да се приемат значителни количества вода по време на курса на лечение.

АКО ИМАТЕ НЯКАВИ СЪМНЕНИЯ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА СЪВЕТ.

Лекарствени и други взаимодействия

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ВЪЗМОЖНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МОЛЯ ИНФОРМИРАЙТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСЯКО ДРУГО ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО ПРИЕМАТЕ.

Бременност и кърмене

ПРИ БРЕМЕННОСТ ИЛИ КЪРМЕНЕ ВИНАГИ СЕ СЪВЕТВАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ НЯКАВО ЛЕКАРСТВО.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини Няма

Специални предупреждения за употребата от спортсти Няма

Данни за помощните съставки, които могат да представляват опасност за някои пациенти

Няма



КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ТОВА ЛЕКАРСТВО

Дозировка

Препоръчителната доза е :

- 1 таблетка по 3 пъти на ден - при болезнен артериит;
- 1 таблетка по 2 пъти на ден - при леки неврологични нарушения, свързани с напреднала възраст или синдром на Рейно.

СПАЗВАЙТЕ ПРЕДПИСАНИЯТА НА ВАШИЯ ЛЕКАР.

ТОВА ЛЕКАРСТВО Е ПРЕДПИСАНО ЛИЧНО НА ВАС ЗА КОНКРЕТНО ЗАБОЛЯВАНЕ:

- **ТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИСПОСОБИ ЗА ДРУГО ЗАБОЛЯВАНЕ;**
- **НЕ ГО ПРЕПОРЪЧВАЙТЕ НА ДРУГИ ХОРА.**

Начин на приложение

Перорално

Таблетките да се гълтат цели, без да се сдъвкат, винаги с голяма чаша вода.

Честота и време на приложение

Дозите се разпределят по време на отделните хранения.

Продължителност на лечението

СПАЗВАЙТЕ ПРЕДПИСАНИЯТА НА ВАШИЯ ЛЕКАР.

При предозиране

Незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

В случай на пропусната доза

Приемете следващата доза в обичайното време. Не взимайте двойна доза.

Риск от зависимост

Няма.

Нежелани лекарствени реакции

КАКТО ВСИЧКИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ТАКА И DUSODRIL МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ПРИ НЯКОИ ПАЦИЕНТИ ДО РАЗЛИЧНИ ПО СТЕПЕН НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ:

- Стомашно-чревни нарушения (диария, гадене, повръщане, болка в стомаха);
- кожен обрив;
- описани са изключително редки случаи на отклонения в лабораторните изследвания на чернодробната функция;
- при някои пациенти, които приемат лекарствения продукт без течност преди лягане, капсулата залепва към хранопровода и причинява локално възпаление;



- в изключително редки случаи - камъни в бъбреците (калциев оксалат).

АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НЯКАКВИ НЕЖЕЛANI ИЛИ ТРЕВОЖNI REAKЦII,
НЕОПИСАНИ В ТАЗИ ЛИСТОВКА, МОЛЯ УВЕДОМЕТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ
ФАРМАЦЕВТ.

Съхранение

Лекарственият продукт не трябва да се използва след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.

Дата на последна редакция на листовката

21 декември 2007 г.

СЪВЕТ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ:

- Ако страдате от синдром на Рейно, препоръчително е да предпазвате пръстите си от студ и влага (с ръкавици), да избягвате резки температурни промени и да се обличате добре.
- Ако страдате от болезнен артериит, препоръчително е да:
 - преустановите тютюнопушенето;
 - да обръщате специално внимание на стъпалата си (да спазвате хигиена, да полагате грижи и да носите подходящи обувки);
 - да ходите пеша всеки ден, при положение че нямате болки в краката през нощта или в покой, и нямате рани на стъпалата.

