

duspatalin[®] 200 mg
дуспаталин 200 мг



mebeverine hydrochloride

СЪСТАВ

Активно вещество:

1 капсула с удължено освобождаване съдържа 200 mg mebeverine hydrochloride.

Помощни вещества:

Магнезиев стеарат, кополимер на естери на поли(мет)акриловата киселина, талк, метилхидроксипропилцелулоза, кополимер на естери метакриловата и акриловата киселина, триацетин, твърди желатинови капсули (размер по. 1) матово бели.

ДЕЙСТВИЕ

Действието на **duspatalin[®]** е спазмолитично (премахва спазъма и облекчава коремната болка).

Mebeverine е облекчаващо спазъма и болката средство, с директно действие върху гладката мускулатура на стомашно-чревния тракт, като облекчава спазмите без да влияе върху нормалната функция на червата. Тъй като mebeverine не действа на автономната нервна система, липсват обичайните нежелани реакции, като сухота в устата, сърцебиене, замъглено виждане, задържане на урина при по-възрастни пациенти. Mebeverine е подходящ и за пациенти с увеличение на простатата и/или глаукома (повишено вътреочно налягане).

ПОКАЗАНИЯ

Възрастни:

- Симптоматично лечение на спазми, предизвикани от стомашно-чревни органични заболявания
- Симптоматично лечение на коремни болки и спазми, дебелочревни и тънкочревни смущения, свързани с Colon Irritabile Синдром (Синдром на раздразненото черво).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Като цяло Mebeverine се понася добре.

Много рядко се съобщава за кожни реакции и замаяване.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Не са известни.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Duspatalin 200 mg, под формата на капсули, не е подходящ за приложение при деца!

ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Опитите с животни не показват опасност за развитието на плода.

Все пак трябва да се имат предвид обичайните предпазни мерки при използване на лекарства по време на бременност.

Mebeverine не се излъчва в кърмата, приеман в терапевтични дози.



ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Не са провеждани изследвания относно влиянието на Дуспаталин върху способността за шофиране и работа с машини.

ПРЕДОЗИРАНЕ

Теоретично може да се предположи, че при предозирание се възбужда централната нервна система.

Не е известен специфична антитоксична терапия.

В тези случаи се препоръчва стомашна промивка и симптоматично лечение.

НЕСЪВМЕСТИМОСТИ

Не са известни.

ДОЗИРОВКА

Дозировката и продължителността на лечение се определят от лекуващия лекар!

Ако не е предписано друго, се препоръчва следната дозировка:

2 пъти дневно по една капсула (200 mg), сутрин и вечер.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Капсулите се приемат през устата, с чаша вода.

Да не се дъвчат!

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

Срок на годност – 3 години!

Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура до 25°C.

Да не се съхранява при температура по-ниска от 5°C!

ВНИМАНИЕ!

Не използвайте опаковката след изтичане срока на годност, отразен върху опаковката!

Да се пази на места, недостъпни за деца!

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

dupatalin[®] капсули 200 mg

Опаковки по 30 капсули

Производител

Solvay Pharmaceuticals B.V.

Weesp

Холандия

Solvay Pharma - България

1680 София

Ул. Хайдушка гора № 48А

Информацията в тази листовка е ограничена!

За допълнителна информация се обръщайте към Вашия лекар или фармацевт!

Септември, 2000 г.

