

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!

ДАТА 15.06.07

Уважаеми пациенти, моля, прочетете тази листовка преди да започнете да употребявате това лекарство, тъй като тя съдържа важна информация! Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт!

## дуспаталин/ *duspatalin*® 135

мебеверин хидрохлорид/*mebeverine hydrochloride*



Solvay Pharmaceuticals

Таблетки със захарно покритие за перорално приложение, съдържащи 135 мг мебеверин хидрохлорид.

### Помощни вещества:

Таблетка: лактоза монохидрат, нишесте (царевично или картофено), повидон, талк, магнезиев стеарат.

Покритие: талк, захароза, желатин, акация, кармелитов восък.

### Показания за приложение:

#### Възрастни

- за симптоматично лечение на коремна болка и спазми, дебелочревни смущения и чревен дискомфорт, дължащ се на синдрома „colon irritabile” (раздразнено дебело черво)
- за лечение на стомашно-чревни спазми, дължащи се на органични заболявания.

### Дозировка и начин на приложение

Приема се по една таблетка три пъти дневно, около 20 минути преди хранене.

Поглъщайте таблетките с вода, без да ги дъвчете!

### Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

### Предупреждения и специални предпазни мерки при употреба

Ако Ви е известно, че имате непоносимост към някои захари, моля уведомете Вашия лекар, преди да приемете този продукт.

### Взаимодействия

Не са известни.

### Бременност и кърмене

Експерименталните проучвания с животни не са показали никакви тератогенни ефекти. Трябва обаче да се имат предвид обичайните предпазни мерки при приемането на каквото и да е лекарство по време на бременност. В терапевтичните дози мебеверин не се екскретира в млякото при кърмещи жени.



### **Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Не са провеждани проучвания за ефектите на лекарството върху способността за шофиране и работа с машини.

### **Нежелани лекарствени реакции**

Много рядко може да възникне реакция на свръхчувствителност, като уртикария, ангиоедем, оток на лицето и обрив.

### **Предозиране**

Теоретично може да се предположи, че при предозиране ще възникне повишена възбудимост на централната нервна система.

Не е известен специфичен антидот (противодействащо средство); препоръчва се стомашна промивка и симптоматично лечение.

### **Фармакодинамика**

*дуспаталин* е мускулотропно, антиспастично лекарство с директно действие върху гладката мускулатура на стомашно-чревния тракт, което облекчава спазмите без да нарушава нормалната функция на червата. Тъй като това му действие не се опосредства от автономната нервна система, липсват обичайните антихолинергични странични ефекти. *дуспаталин* е подходящ при пациенти с простатна хипертрофия и глаукома.

### **Фармакокинетика**

*дуспаталин* бързо и напълно се абсорбира след перорален прием под формата на обвита таблетка.

*дуспаталин* не се излъчва непроменен, а се метаболизира напълно. Първият етап в метаболизма му е хидролиза, при което се получава вератрикова киселина и мебеверинов алкохол. Вератриковата киселина се излъчва в урината, както и мебевериновият алкохол, като една част е под формата на карбоксилова киселина, а друга – като деметилирана карбоксилова киселина.

### **Несъвместимости**

Няма известни.

### **Срок на годност и условия на съхранение**

5 години. Не го съхранявайте при температура над 30<sup>0</sup>С. Не го замразявайте. Съхранявайте го в оригиналната му опаковка.

### **Съхраняване и използване**

Не употребявайте това лекарство след изтичане на срока му на годност.

Пазете това лекарство на място, на което децата не могат да го достигнат или видят.

### **Опаковки**

По 30 обвити таблетки.

### **Притежател на разрешението за употреба**

Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van Houtenlaan 36, 1381 Weesp, The Netherlands

### **Производители**



**1. Solvay Pharmaceuticals B.V.**  
**Veertweg 12, 8121 AA, Olst The Netherlands**

**2. Solvay Pharmaceuticals,**  
**Route de Belleville,**  
**Lieu dit Maillard,**  
**01400 Châtillon sur Chalaronne,**  
**Франция**

**Допълнителна информация**

*Внимание! Информацията в тази листовка е ограничена!*

*В случай на допълнителни въпроси се обърнете към Вашия лекуващ лекар*

*или към:*

*СОЛВЕЙ ФАРМА ЕООД*

*София Тауър, ет. 5, офис 52*

*Бул. Ал. Стамболийски 103*

*1303, София*

*Тел: ++ 3592 9234 700*

*Факс: ++ 3592 9234 701*

**Дата на последна редакция на текста**

**Декември 2004**

