



Echinacin[®] Madaus Capsetten, pastilles **Ехинацин Мадаус капсетен, пастили**

Драги Пациенти,

Моля, прочетете следващата по-долу инструкция внимателно, тъй като тя съдържа важни данни за това какво трябва да спазвате по време на употреба на този продукт. Ако имате някакви въпроси, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Лекарствено вещество: изсушен получен чрез пресоване сок от Echinaceae purpureae herba

Състав: 1 пастил съдържа:

Лекарствено вещество: Dried pressed juice from fresh flowering purple coneflower herb (сок от стръкове на ехинацея - Echinacea purpurea herba) (31.5 – 53.6 : 1) 88,5 mg;

Помощни вещества: глицерол, желатин, лецитин, царевично нишесте, гуар, захарин-натрий, лимонена киселина - безводна, натриев цикламат, ароматизатор.

Опаковка:

Оригинални опаковки с 20 и 40 пастили.

Растителен лекарствен продукт за подпомагане на естествените защитни сили на организма.

Производител и притежател на разрешението за употреба:

MADAUS AG, D-51101 Cologne

Tel.: 0221/8998-0, fax: 0221/8998-711

e-mail: info@madaus.de

Показания:

Помощно средство за профилактика и лечение на често повтарящи се инфекции на горните дихателните пътища.

Предупреждение:

При липса на ефект или влошаване на състоянието се консултирайте с лекар.

Противопоказания:

Кога не трябва да употребявате Ехинацин Мадаус капсетен?

Ехинацин Мадаус капсетен не трябва да се прилага при доказана алергия към растения от сем. сложноцветни, както и свърхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества. От принципни съображения не трябва да прилагате Ехинацин Мадаус капсетен при прогресиращи органични заболявания като туберкулоза, левкемия, колагенози, множествена склероза, СПИН, HIV-инфекции и други автоимунни заболявания.

Специални предупреждения за употреба

Продуктът съдържа глицерол, който е вреден при високи дози и може да причини главоболие, стомашно дразнене и диария.

Лекарствени взаимодействия:

Какви други лекарства влияят върху действието на Ехинацин Мадаус капсетен?

Няма известни взаимодействия с други лекарствени средства.

Дозировка, начин и продължителност на приложение:

Ако лекарят не е предписал друго, важат дадените по-долу инструкции. Моля, спазвайте ги, защото иначе Ехинацин Мадаус капсетен няма да подействат както трябва.

По колко и колко често трябва да вземате Ехинацин Мадаус капсетен?

Ако не е предписано друго, възрастни и деца на 12 години вземат по 1 пастил 3-4 пъти дневно.

Деца между 6 и 12 години вземат 1 пастил 2 - 3 пъти дневно.

Деца между 2 и 5 години вземат 1 пастил 1 - 2 пъти дневно

Могат да се смучат, дъвчат или да се гълтат цели с малко течност.

Колко време трябва да употребявате Ехинацин Мадаус капсетен?



Ехинацин Мадаус капсетен не трябва да се прилага без прекъсване повече от 8 седмици.

Нежелани лекарствени реакции:

Какви нежелани реакции могат да настъпят докато използвате Ехинацин Мадаус капсетен?

В редки случаи могат да настъпят реакции на свръхчувствителност. При лекарствени продукти, съдържащи ехинацея, са наблюдавани кожни обриви, сърбеж, оток на лицето, задух, световъртеж и понижаване на кръвното налягане.

Моля, ако забележите някои нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Условия за съхранение и срок на годност

Крайният срок на годност е отпечатан върху кутийката и блистера.

Да не се използва след тази дата!

Съхранява се при температура под 25°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Официален представител

"Натурпродукт" ООД

1592 - София, бул. "Искърско шосе" No. 12

телефон (02) 79 12 19, факс (02) 97 11 217

Последна редакция на информацията

Октомври 2003 г.

Рег. №: 990 0062

