

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НЧ54-5, 24.04.09

ЕФЕКТИН ER 75 mg

Одобрено: 34/24.03.09

75 mg капсули с удължено освобождаване, твърди

ЕФЕКТИН ER 150 mg

150 mg капсули с удължено освобождаване, твърди

Венлафаксин

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ЕФЕКТИН ER и за какво се използва
2. Преди да приемете ЕФЕКТИН ER
3. Как да приемате ЕФЕКТИН ER
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ЕФЕКТИН ER
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕФЕКТИН ER И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ЕФЕКТИН ER е антидепресант, който принадлежи към група лекарства, наричани инхибитори на обратното захващане на серотонин и норадреналин (SNRIs). Тази група лекарства се използва за лечение на депресия и други състояния като тревожни разстройства. Счита се, че хората, които са депресирани и/или в тревожно състояние, имат по-ниски нива на серотонин и норадреналин в мозъка. Не е напълно ясно как действат антидепресантите, но те могат да помогат чрез повишаване нивата на серотонина и норадреналина в мозъка.

ЕФЕКТИН ER е предназначен за лечение на възрастни с депресия. ЕФЕКТИН ER е също предназначен за лечение на възрастни със следните тревожни разстройства: генерализирано тревожно разстройство, социално тревожно разстройство (страх и избягване на социални ситуации) и паническо разстройство (пристъпи на паника). Правилното лечение на депресията или тревожните разстройства е важно, за да се почувствува по-добре. Ако не се лекува, Вашето състояние може да не отшуми и може да стане по-сериозно и по-трудно за лечение.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЕФЕКТИН ER**Не приемайте ЕФЕКТИН ER**

- Ако сте алергични към венлафаксин или към някоя от останалите съставки на ЕФЕКТИН ER.



- Ако приемате също или сте приемали в рамките на последните 14 дни някакви лекарства, известни като необратимиmonoаминооксидазни инхибитори (МАОИ), използвани за лечение на депресия или болестта на Паркинсон. Приемането на необратим МАОИ заедно с други лекарства, включително ЕФЕКТИН ER, може да причини сериозни или дори животозастрашаващи нежелани реакции. Също така трябва да изчакате поне 7 дни, след като спрете да приемате ЕФЕКТИН ER, преди да приемате някакви МАОИ (вижте също точките "Серотонинов синдром" и "Прием на други лекарства").

Обърнете специално внимание при употребата на ЕФЕКТИН ER

- Ако използвате други лекарства, които приети едновременно с ЕФЕКТИН ER биха могли да повишат риска от развитие на серотонинов синдром (вж. точка "Прием на други лекарства").
- Ако имате очни проблеми, като определени видове глаукома (повищено налягане в окото).
- Ако имате анамнеза за високо кръвно налягане.
- Ако имате анамнеза за сърдечни проблеми.
- Ако имате анамнеза за припадъци (гърчове).
- Ако имате анамнеза за ниски нива на натрий и кръвта (хипонатриемия).
- Ако имате склонност да образувате синини или склонност да кървите лесно (анамнеза за нарушения в кръвосъсирването), или ако приемате други лекарства, които могат да повишат риска от кървене.
- Ако нивата на холестерола Ви се покачват.
- Ако имате анамнеза, или ако някой във Вашето семейство е имал мания или биполярно разстройство (чувствате се свръхвъзбудени или еуфорични).
- Ако имате анамнеза за агресивно поведение.

ЕФЕКТИН ER може да причини усещане за беспокойство или неспособност да се стои спокойно в седнало или изправено положение. Трябва да кажете на Вашия лекар, ако това Ви се случи.

Ако някое от тези състояния се отнася за Вас, моля кажете на Вашия лекар, преди да приемате ЕФЕКТИН ER.

Суицидни мисли и влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство

Ако сте в депресия и/или имате тревожни разстройства понякога могат да се появят мисли за самонараняване или самоубийство. Тези мисли могат да се засилят, когато започнете да приемате за пръв път антидепресанти, тъй като за всички тези лекарства е необходимо време, преди да започнат да действат, обикновено около две седмици, но понякога и по-дълго.

Вие по вероятно мислите така:

- Ако преди това сте имали мисли за самонараняване или самоубийство.
- Ако сте младеж. Информация от клинични проучвания показва повишен риск от суицидно поведение при младежи (под 25 години) с психиатрични състояния, които са били лекувани с антидепресант.

Ако имате мисли за самонараняване или самоубийство по което и да е време, уведомете  Вашия лекар или незабавно отидете в болница.

Може да е полезно да споделите с роднина или близък приятел, че сте депресиран или имате тревожно разстройство, и да ги помолите да прочетат тази листовка. Можете да ги помолите да Ви кажат, ако мислят, че Вашите депресия или тревожност се влошават, или ако те се тревожат за промени във Вашето поведение.

Сухота в устата

Сухота в устата се съобщава при 10% от пациентите, лекувани с венлафаксин. Това може да повиши риска от кариес. Ето защо трябва да обърнете специално внимание на хигиената на Вашите зъби.

Употреба при деца и юноши под 18-годишна възраст

ЕФЕКТИН ER трябва нормално да не се използва за деца и юноши под 18 години. Също така трябва да знаете, че пациентите под 18 имат повишен риск от нежелани реакции, като суициден опит, суицидни мисли и враждебност (предимно агресия, опозиционно поведение и гняв), когато приемат този клас лекарства. Независимо от това Вашият лекар може да предпише ЕФЕКТИН ER на пациенти под 18 години, тъй като той/тя решава дали това е в тяхен най-голям интерес. Ако Вашият лекар е предписал ЕФЕКТИН ER за пациент под 18 години и Вие искате да обсъдите това, моля обърнете се отново към Вашия лекар. Трябва да информирате Вашия лекар, ако се появи или влоши някой от изброените по-горе симптоми, когато пациентите под 18 приемат ЕФЕКТИН ER. Освен това дългосрочните ефекти на ЕФЕКТИН ER върху безопасността на растежа, съзряването и развитието на познавателните способности и поведението в тази възрастова група, все още не са демонстрирани.

Прием на други лекарства


Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

Вашият лекар трябва да реши дали можете да вземате ЕФЕКТИН ER с други лекарства.

Не започвайте и не спирайте да приемате каквито и да е лекарства, включително и тези без рецептa, природни или билкови лекарства, преди да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

- Мономинооксидазни инхибитори (МАОИ: вж. точка “Преди да приемете ЕФЕКТИН ER”)
- Серотонинов синдром:
Серотониновият синдром, който е потенциално животозастрашаващо състояние (вж. точка “Възможни нежелани реакции”), може да се появи при лечение с венлафаксин, особено когато той се приема с други лекарства. Примерите за такива лекарства включват:
 - Триптани (използвани за мигрена)
 - Лекарства за лечение на депресия, например SNRI, SSRIs, трициклични антидепресанти или лекарства, съдържащи литий
 - Лекарства, съдържащи линезолид, който е антибиотик (използван за лечение на инфекции)
 - Лекарства, съдържащи моклобемид, който е обратим МАОИ (използван за лечение на депресия)
 - Лекарства, съдържащи сибутрамин (използван за намаляване на теглото)
 - Лекарства, съдържащи трамадол (болкоуспокояващо)
 - Продукти, съдържащи жъlt кантарион (наричан още *Hypericum perforatum*, който е природно или билково лекарство, използвано за лечение на лека депресия)
 - Продуктите, съдържащи триптофан (използвани за проблеми, например със съня и депресия)

Признаките и симптомите на серотонинов синдром могат да включват комбинация от следните: неспокойство, халюцинации, загуба на координация, ускорена сърдечна дейност, повищена телесна температура, бързи промени в кръвното налягане, свръхактивни рефлекси, диария, кома, гадене, повръщане. Потърсете незабавно медицинска помощ, ако мислите, че получавате серотонинов синдром.



Следните лекарства могат също да взаимодействат с ЕФЕКТИН ER и трябва да се използват с повищено внимание. Особено важно е да споменете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате лекарства, съдържащи:

- Кетоконазол (противогъбично лекарство)
- Халоперидол или рисперидон (за лечение на психиатрични състояния)
- Метопролол (бета-блокер за лечение на високо кръвно налягане и на сърдечни проблеми)

Прием на ЕФЕКТИН ER с храни и напитки

ЕФЕКТИН ER трябва да се приема с храната (вж. точка 3 “КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЕФЕКТИН ER ”).

Трябва да избягвате употребата на алкохол, докато приемате ЕФЕКТИН ER.

Бременност и кърмене

Кажете на Вашия лекар, ако забременеете или ако се опитвате да забременеете. Трябва да използвате ЕФЕКТИН ER едва след като обсъдите потенциалните ползи и потенциалните рискове за Вашето неродено дете с Вашия лекар.

Ако приемате ЕФЕКТИН ER по време на бременност, уведомете Вашите акушерка и/или лекар, тъй като Вашето бебе може да има някакви симптоми, когато се роди. Тези симптоми обикновено започват през първите 24 часа след раждането на детето. Те включват недостатъчно хранене и проблеми с дишането. Ако Вашето бебе има тези симптоми, когато се роди, и Вие имате притеснения, свържете се с Вашите лекар и/или акушерка, които ще могат да Ви посъветват.

ЕФЕКТИН ER преминава в кърмата. Има риск за ефект върху бебето. Ето защо трябва да обсъдите това с Вашия лекар и той/тя ще реши дали трябва да спрете да кърмите или да спрете терапията с ЕФЕКТИН ER.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не използвайте никакви уреди или машини, докато не разберете как Ви влияе ЕФЕКТИН ER.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЕФЕКТИН ER

Винаги приемайте ЕФЕКТИН ER точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайно препоръчваната начална доза за лечение на депресия, генерализирано тревожно разстройство и социално тревожно разстройство е 75 mg на ден. Дозата може да бъде повишавана от Вашия лекар постепенно, и ако е необходимо, дори до максимум 375 mg дневно за депресия. Ако се лекувате за паническо разстройство, Вашият лекар ще започне с по-ниска доза (37,5 mg) и след това ще повишава дозата постепенно. Максималната доза за генерализирано тревожно разстройство, социално тревожно разстройство и паническо разстройство е 225 mg/дневно.



Приемайте ЕФЕКТИН ER по приблизително едно и също време всеки ден сутрин или вечер. Капсулите трябва да се погълнат цели с течност и да не се отварят, разчупват, дъвчат или разтварят.

ЕФЕКТИН ER трябва да се приема с храна.

Ако имате чернодробни или бъбречни проблеми, говорете с Вашия лекар, тъй като може да е необходимо Вашата доза ЕФЕКТИН ER да се промени.

Не спирайте приема на ЕФЕКТИН ER, без да се консултирате с Вашия лекар (вж. точка "Ако сте спрели приема на ЕФЕКТИН ER").

Ако сте приели повече от необходимата доза ЕФЕКТИН ER

Обадете се незабавно на Вашия лекар или фармацевт, ако сте приели повече от необходимата доза ЕФЕКТИН ER, предписана от Вашия лекар.

Симптомите на евентуално предозиране могат да включват ускорено сърцебиене, промени в нивото на будност (вариращи от сънливост до кома), замъглено виддане, гърчове или припадъци и повръщане.

Ако сте пропуснали да приемете ЕФЕКТИН ER

Ако пропуснете доза, приемете я веднага след като си спомните. Ако обаче е настъпило време за следващата доза, прескочете пропуснатата доза и приемете само единична доза, както обикновено. Не вземайте повече от дневното количество ЕФЕКТИН ER, което Ви е било предписано за един ден.

Ако сте спрели приема на ЕФЕКТИН ER

Не спирайте да приемате Вашето лечение и не понижавайте дозата без съвет от Вашия лекар, дори ако се чувствате по-добре. Ако Вашият лекар смята, че повече не се нуждаете от ЕФЕКТИН ER, той/тя може да Ви помоли бавно да понижите Вашата доза преди да спрете изцяло лечението. Известно е, че настъпват нежелани реакции, когато хората спират употребата на ЕФЕКТИН ER, особено когато се спира внезапно или дозата се понижава твърде бързо. Някои пациенти могат да почувстват симптоми като умора, световъртеж, замаяност, главоболие, сънливост, нощи кошмари, сухота в устата, загуба на апетит, гадене, диария, нервност, ажитираност, обърканост, шум в ушите, мравучкане или, рядко, усещания като от електрически шок, слабост, потене, гърчове или грипоподобни симптоми.

Вашият лекар ще Ви посъветва за това как трябва постепенно да спрете лечението с ЕФЕКТИН ER. Ако почувствате някой от тези или други симптоми, които Ви притесняват, обърнете се към Вашия лекар за допълнителен съвет.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ЕФЕКТИН ER може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



Не се притеснявайте, ако забележите малки бели гранули във Вашите изпражнения след като приемете ЕФЕКТИН ER. Отвътре капсулите ЕФЕКТИН ER представляват микросфери или малки бели топченца, които съдържат активното вещество венлафаксин. Тези микросфери се освобождават от капсулата във Вашия stomashno-чревен тракт. Когато микросферите преминават по цялата дължина на Вашия stomashno-чревен тракт, венлафаксин бавно се освобождава. „Обвивката” на микросферите остава неразтворена и се елиминира във Вашите изпражнения. Затова въпреки че можете да забележите микросфери във Вашите изпражнения, Вашата доза венлафаксин е била абсорбирана.

Алергични реакции

Ако получите някоя от следните реакции, не приемайте ЕФЕКТИН ER. Незабавно кажете на Вашия лекар или отидете в спешното отделение на най-близката болница:

- Стягане в гърдите, хрипове, затруднено прегълъщане или дишане
- Подуване на лицето, гърлото, ръцете или ходилата
- Чувство на нервност или тревожност, замаяност, чувство за пулсиране, внезално зачервяване на кожата и/или чувство на топлина
- Тежък обрив, сърбеж или уртици (повдигнати плаки от червена или бледа кожа, които често сърбят)

Сериозни нежелани реакции

Ако забележите някои от следните признания, може да се нуждаете от спешна медицинска намеса:

- Сърдечни проблеми като ускорен или неправилен сърдечен ритъм, повищено кръвно налягане
- Проблеми с очите като замъглено виждане, разширени зеници
- Проблеми с нервите като замаяност, усещане за иглички, нарушения на движенията, гърчове или припадъци
- Психиатрични проблеми като хиперактивност и еуфория
- Синдром на спиране на лечението (вж. точка "КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЕФЕКТИН ER, Ако сте спрели приема на ЕФЕКТИН ER").

Пълен списък на нежеланите реакции

Честотата (вероятността за появя) на нежеланите реакции се класифицира както следва:

Много чести	Повлияват повече от 1 потребител на 10
Чести	Повлияват от 1 до 10 потребители на 100
Нечести	Повлияват от 1 до 10 потребители на 1 000
Редки	Повлияват от 1 до 10 потребители на 10 000
С неизвестна честота	От наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата

• Нарушения на кръвта

Нечести: кръвонасядане; смолисто черни изпражнения (фекалии) или кръв в изпражненията, което може да е признак на вътрешен кръвоизлив

С неизвестна честота: намален брой тромбоцити в кръвта Ви, което води до повишен риск от кръвонасядане или кървене; нарушения на кръвта, което може да доведе до повишен риск от инфекции



- **Обменни/хранителни нарушения**

Чести: загуба на тегло; повишен холестерол

Нечести: наддаване на тегло

С неизвестна честота: леки промени в кръвните нива на чернодробните ензими; понижение на кръвните нива на натрия; сърбеж, жълта кожа или пожълтяване на очите, тъмна урина или грипоподобни симптоми, които са симптоми на възпаление на черния дроб (хепатит); обърканост, прекомерен прием на вода (известно като CHCAX); патологично отделяне на кърма

- **Нарушения на нервната система**

Много чести: сухота в устата; главоболие

Чести: патологични сънища; понижено либидо; замаяност; повишен мускулен тонус; безсъние; нервност; иглички и тръпки; седиране; тремор; обърканост; чувство за изолираност (или отделеност) от самия себе си и действителността

Нечести: загуба на чувства или емоции; халюцинации; неволеви движения на мускулите; ажитираност; нарушени координация и равновесие

Редки: чувство за беспокойство или невъзможност да се стои спокойно в седнало или изправено положение; гърчове или припадъци; чувство за свръхвъзбуденост или еуфория

С неизвестна честота: висока температура с ригидни мускули, обърканост или ажитираност и потене, или ако почувствате внезапни мускулни движения, които не можете да контролирате, това може да са симптоми на сериозни състояния, известни като невролептичен малигнен синдром; еуфорични чувства, съниливост, постоянни бързи движения на очите, тромавост, неспокойство, чувство като че ли сте пияни, потене или ригидни мускули, които са симптоми на серотонинергичен синдром; дезориентираност и обърканост, съпроводени често от халюцинация (делир); скованост, спазми и неволеви движения на мускулите; мисли за самонараняване или самоубийство

- **Нарушения на зрението и слуха**

Чести: замъглено виждане

Нечести: променени вкусови усещания; звънене в ушите (тинитус)

С неизвестна честота: тежки болки в очите и понижено или замъглено виждане

- **Нарушения на сърцето или кръвообращението**

Чести: повищено кръвно налягане; зачервяване; сърцевиене

Нечести: чувство за замаяност (особено когато се изправяте прекалено бързо), припадъци, ускорена сърдечна дейност

С неизвестна честота: понижено кръвно налягане; абнормна, ускорена или неравномерна сърдечна дейност, която може да доведе до припадане

- **Нарушения на дишането**

Чести: прозяване

С неизвестна честота: кашлица, хрипове, задух и висока температура, които са симптоми на възпаление на белите дробове, свързано с повишение на белите кръвни клетки (белодробна еозинофилия)

- **Нарушения на храносмилането**

Много чести: гадене

Чести: намален апетит; запек; повръщане

Нечести: скърдане със зъби; диария

С неизвестна честота: тежки болки в корема или гърба (които биха могли да показват сериозен проблем в червата, черния дроб или панкреаса)

- **Кожни нарушения**

Много чести: потене (включително нощно изпотяване)

Нечести: обрив; патологична загуба на коса



С неизвестна честота: кожен обрив, който може да доведе до тежко изприщване и белене на кожата; сърбеж; лек обрив

- **Мускулни нарушения**

С неизвестна честота: необяснима мускулна болка, чувствителност или слабост (рабдомиолиза)

- **Нарушения на пикочната система**

Чести: затруднено отделяне на урина; повишенна честота на уриниране

Нечести: невъзможност да се отдели урина

- **Репродуктивни и сексуални нарушения**

Чести: патологична еякуляция/оргазъм (мъже); липса на оргазъм; еректилна дисфункция (импотентност); нередовна менструация като засилено кървене или засилено нередовно кървене

Нечести: абнормен оргазъм (жени)

- **Общи**

Чести: слабост (астения); студени тръпки

Нечести: чувствителност към слънчева светлина

С неизвестна честота: подуто лице или език, задух или затруднено дишане често с обриви (това може да е сериозна алергична реакция)

ЕФЕКТИН ER понякога причинява нежелани реакции, които може да не усетите като повишение на кръвното налягане или абнормен сърден ритъм; леки промени в кръвните нива или чернодробните ензими, натрия или холестерола. По-рядко ЕФЕКТИН ER може да понижи функцията на тромбоцитите в кръвта Ви, което води до повышен риск от кръвонасядане или кървене. Затова Вашият лекар може от време на време да желае да извърши кръвни изследвания, особено ако сте приемали ЕФЕКТИН ER дълго време.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНИВАТЕ ЕФЕКТИН ER

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ЕФЕКТИН ER след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Да се съхранява под 30°C.

Съхранявайте блистерите в оригиналната опаковка, за да се предпазят от светлина и влага.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ЕФЕКТИН ER

Активното вещество е венлафаксин.

ЕФЕКТИН ER 75 mg



- Всяка капсула с удължено освобождаване съдържа 75 mg венлафаксин като венлафаксинов хидрохлорид.
- Останалите съставки са:

Състав на капсулата: микрокристална целулоза, етилцелулоза, хидроксипропилметилцелулоза
Обвивка на капсулата: желатин, титаниев диоксид (E171), червен железен оксид (E172), жълт железен оксид (E172), талк, мастило

ЕФЕКТИН ER 150 mg

- Всяка капсула с удължено освобождаване съдържа 150 mg венлафаксин като венлафаксинов хидрохлорид.
- Останалите съставки са:

Състав на капсулата: микрокристална целулоза, етилцелулоза, хидроксипропилметилцелулоза
Обвивка на капсулата: желатин, титаниев диоксид (E171), червен железен оксид (E172), жълт железен оксид (E172), талк, мастило

Как изглежда ЕФЕКТИН ER и какво съдържа опаковката

Капсула с удължено освобождаване, твърда

ЕФЕКТИН ER 75 mg

Капсула с непрозрачен прасковен цвят. Маркирани с червено мастило "W" и "75"върху капсулите.

ЕФЕКТИН ER 150 mg

Капсула с непрозрачен тъмно-оранжев цвят. Маркирани с червено мастило "W" и "150"върху капсулите.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:


Wyeth-Lederle Pharma GmbH
Storchengasse 1
A-1150 Vienna
Австрия

Производител:

Wyeth Medica Ireland
Little Connell
Newbridge
Co.Kildare
Ирландия

Този лекарствен продукт е разрешен в страните членки на ЕЕО под следните имена:

Австрия	Efectin ER 37,5 mg - Kapseln Efectin ER 75 mg - Kapseln Efectin ER 150 mg - Kapseln
Белгия, Люксембург	Efexor-Exel 37,5 Efexor-Exel 75 Efexor-Exel 150
Белгия	Venlax 37,5 mg



	Venlax 75 mg Venlax 150 mg
България	Efectin ER 75 mg Efectin ER 150 mg
Чешка република, Румъния	Efectin ER 37.5 mg Efectin ER 75 mg Efectin ER 150 mg
Кипър, Гърция, Естония, Литва, Португалия	Efexor XR
Латвия	Efexor XR Efexor XR 75 Efexor XR 150
Дания, Финландия, Исландия, Норвегия, Швеция	Efexor Depot
Франция	Effexor L.P. Venlafaxine Wyeth L.P
Германия	Trevilor retard 37,5 mg Trevilor retard 75 mg Trevilor retard 150 mg
Ирландия, Малта, Обединеното кралство	Efexor XL
Холандия	Efexor XR 37,5 Efexor XR 75 Efexor XR 150
Италия	Efexor Faxine
Полша	Efectin ER 37,5 Efectin ER 75 Efectin ER 150
Словашка република	Efectin ER 37,5 mg caps plg Efectin ER 75 mg caps plg Efectin ER 150 mg caps plg
Словения	Efectin ER 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem Efectin ER 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem Efectin ER 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
Испания	Vandral Retard 75 mg cápsulas de liberación prologada Vandral Retard 150 mg cápsulas de liberación prologada

*[Моля, забележете, че не всички продукти и разфасовки могат да са налични.]

Дата на последно одобрение на листовката

07/2008

