

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА Агенция по лекарствата

Листовка - Приложение 2

Към РУ №. 11-1651, 29.02.08

Одобрено: 12/12.02.08

ЕФИЗОЛ

EFISOL

Таблетки за смучене, пресовані
Dequalinium chloride / Ascorbic acid

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 5-7 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В ТАЗИ ЛИСТОВКА:

1. Какво представлява Ефизол и за какво се използва
2. Преди да приемете Ефизол
3. Как да приемате Ефизол
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Ефизол
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕФИЗОЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Ефизол потиска развитието на някои микроорганизми в мястото на приложение.

Той повлиява различни видове болесттворни причинители, в това число антибиотики гноеродни бактерии, а също така и някои нечувствителни спрямо



причинители. Притежава и противогъбична активност (спрямо кандида, някои епидермофити и трихофити). Разрушава причинителите на инфекции като повлиява образуването на техните белтъци, ензими и уврежда клетъчните им мембрани.

Аскорбинова киселина (вит С) уплътнява стените на кръвоносните съдове, намалява пропускливостта им, възможността за кървене и образуване на оток. Притежава противовъзпалителен ефект.

Този лекарствен продукт е предназначен:

- За локално антисептично (противобактериално) лечение на леки възпалителни процеси в устната кухина и носогълътката (катарални, улцерозни и фибринозни гингивити; афтозни стоматити; кандидоза /сооп/; фарингити; тонзилити; ларингити и глосити).
- За профилактика на инфекции преди и следоперативни манипулации в областта устата и гърлото.
- В комплексното лечение, съвместно с антибиотици или сульфонамиди, при по-сериозни инфекции на носогълътката.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЕФИЗОЛ

Не приемайте Ефизол:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към някое от активните и/или помощните вещества на продукта.

Обърнете специално внимание при употребата на Ефизол:

Поради липсата на обезболяваща компонента в продукта не е уместно приложението му при възпалителни процеси, съпроводени със силна болезненост.

При наличие на клинични симптоми за разпространение на инфекцията е необходимо и назначаване на системно противобактериално лечение.

При появата на каквito и да е нежелани ефекти, приемът на Ефизол се преустановява и се назначава друг вид лечение.

Едновременната употреба с други продукти за локално приложение се извършва внимателно и след преценка от страна на лекуващия лекар.

Ако не настъпи подобрене или има задълбочаване на симптоматиката е необходима консултация с лекар.



Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насъкоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецепт. Съществува вероятност при едновременно приложение с кайексалат (продукт за лечение на повищено ниво на калия в организма) да се получат тежки увреждания на кожата и лигавиците, особено в stomашно-чревния тракт.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

До момента няма данни от съответни епидемиологични проучвания относно въздействието на Ефизол върху бременността. Поради това трябва да се подхожда предпазливо при употребата му при бременни жени.

Ефизол може да се прилага при кърмещи жени в препоръчваните доза и продължителност на лечебния курс.

Шофиране и работа с машини

Ефизол не оказва влияние върху шофирането и работата с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Ефизол

Този лекарствен продукт съдържа като помощно вещество лактоза, което го прави неподходящ за пациенти с лактозна непоносимост.

Въпреки ниското съдържание на захари (0.625 g) употребата на продукта при диабетици трябва да се извършва с повишено внимание при контролиране стойностите на кръвната захар.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЕФИЗОЛ

Винаги приемайте Ефизол точно както е посочено в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт

Прилага се по 1 таблетка за смучене през 2-3 часа (не повече от 8-10 таблетки за 24 часа).

Таблетките не се дъвчат. Половин час след приемането им е необходимо да се въздържат от приемане на храна и течности.

Препоръчва се лечението да продължи 1-2 дни след отзукаване на оплакванията. Общата продължителност на лечението не трябва да надвиши 5-7 дни (опасност от нарушаване на нормалната бактериална флора в устната кухина и гърлото).



Продуктът не е подходящ за приложение при деца под 4 години поради риск от попадане на таблетката в дихателните пътища.

Ако сте приемали повече от необходимата доза Ефизол

Няма данни за предозиране с Ефизол.

Ако сте пропуснали да приемете Ефизол

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Направете това във времето на следващия регулярен прием.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Ефизол може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Продуктът се понася добре, не дразни тъканите и няма съобщения за сериозни нежелани ефекти. Рядко може да предизвика гадене и позиви за повръщане; много рядко алергични реакции, чувство за парене и дразнене или сухота в устната кухина; нарушаване развитието на нормалната бактериална флора в устната кухина при продължителна употреба.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ЕФИЗОЛ

При температура под 25° С.

Съхранявайте на място недостъпно за деца!

Не използвайте Ефизол след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Ефизол

- Активните съставки са: деквалиниев хлорид 0.25 mg и аскорбинова киселина 30 mg (dequalinium chloride / ascorbic acid).
- Другите съставки са: глюкоза, захарин натрий, пектин, ванилин, захароза, какао, лактозаmonoхидрат, магнезиев стеарат.

Как изглежда Ефизол и какво съдържа опаковката

Ефизол представлява кръгли плоски пресовани таблетки за смучене с черта от едната страна, с кафяв мозаечен цвят .

По 20 броя таблетки за смучене са опаковани в блистери от PVC/PVDC/AL фолио. По 1 блистер е поставен в единична картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

"Актавис" ЕАД
ул. "Атанас Дуков" № 29
София, България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Производител
"Балканфарма Дупница" АД,
България, гр. Дупница, ул. "Самоковско шосе" 3
Тел. (0701) 58 196; Факс. (0701) 58 555

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

"Актавис" ЕАД
ул. "Атанас Дуков" № 29
София, България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Дата на последно одобрение на листовката – Февруари 2008 г.

