


## Листовка за пациента

**EGLONYL®**  
инжекции  
Сулпирид

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗБАТА	
Приложение към разрешителна употреба №	
618/05.03.02	

### Състав

Всяка ампула съдържа 100 mg сулпирид.

Помощни вещества: сярна киселина, натриев хлорид, вода за инфузии.

### Фармакотерапевтично действие

Еглонил (сулпирид) принадлежи към групата на бензамидните невролептици, използвани при психиатрични заболявания.

### Показания

Нарушения в поведението с прояви на възбуда и агресивност при олигофрени, хиперкинетични състояния с намалено внимание и нарушение на личността.

Делирни състояния с различен произход.

Абстинентен синдром (овладяване на двигателна възбуда, агресивност, вегетативна симптоматика).

Шизофрения и други психотични състояния (остри и хронични психози).

### Противопоказания

Свръхчувствителност към сулпирид.

Феохромоцитом и болест на Паркинсон.

### Странични ефекти

*Ендокринни/метаболитни* - аменорея, напрежение в млечните жлези, галакторея, гинекомастия, импотентност или фригидност, наддаване на тегло.

*Неврологични и от страна на централната нервна система* - спастичен тортиколизис (крива шия), очедвигателни кризи, тризмус, сънливост, замаяност, депресираност, разстройства в съня, главоболие, безпокойство, нарушена концентрация.

*Кардиологични* – ортостатична хипотензия.

*Стомашно-чревни* - гадене, повръщане, запек, безапетитие.

При поява на странични ефекти трябва да се информира лекуващия лекар или фармацевта.

## **Лекарствени взаимодействия**

Пациенти, лекуващи се със сулпирид не бива да приемат алкохолни напитки по време на лечението поради усилване на седативния ефект.

Пациенти, лекуващи се със сулпирид не бива да приемат леводопа (антипаркинсонов препарат).

Със внимание трябва да се прилагат антихипертензивни средства, средства, подгискащи централната нервна система (сънотворни, барбитурати, бензодиазепини), литий или трамадол.

## **Предпазни мерки**

Желателно е да се ограничи приемът на сулпирид по време на бременността, а кърменето трябва да се преустанови, ако се приема сулпирид.

Необходимо е специално внимание при възрастни пациенти, при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност, хипертиреоидизъм, белодробни и сърдечно-съдови заболявания, епилепсия или уринарна ретенция, както и при пациенти с история за свръхчувствителност към други бензамидни производни (Metoclopramide, Tiapride, Sultopride).

В случай на хипертермия терапията със сулпирид да се прекъсне незабавно.

## **Предупреждения**

Седативният ефект на невролептиците може да намали вниманието и в резултат шофирането и боравенето с машини да се окаже опасно. Лекарството силно повлиява умствените и психичните възможности. По време на терапия с него се забранява управлението на превозни средства и работата с машини.

## **Дозироване и начин на приложение**

Дозата, начинът на приложение и продължителността на терапията се определят от лекуващия лекар. Дозата е индивидуална и може да се променя в зависимост от състоянието на пациента.

## **Предозироване**

В случай на предозироване на сулпирид може да се появят симптоми на спастичен тортиколис (крива шия), протрузия на езика или тризмус. В такива случаи терапията е единствено симптоматична.

## **Съхранение**

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

**Срок на годност**

Пет (5) години

Да не се използва след изтичане на срока на годност.

**Опаковка**

Кутия с 30 ампули от 2 мл.

**Притежател на разрешението за употреба**

АЛКАЛОИД АД

Бул. "Ал. Македонски" 12

1000 Скопие

Република Македонија

**Производител**

АЛКАЛОИД АД

Бул. "Ал. Македонски" 12

1000 Скопие

Република Македонија

В сътрудничество със Sanofi-Synthelabo, Франция

**Дата на последната редакция на текста на листовката**

Януари 2002 г.