

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

1. ОПИСАНИЕ НА ЛЕКАРСТВОТО

а) ИМЕ:

ERCEFURYL 200 mg
ЕРЦЕФУРИЛ 200 мг

б) КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Нифуроксазид 200 мг.

Помощи вещества:

Сукроза 72.0 мг.
Магнезиев стеарат 1.8 мг.
Пшеничено брашно 88.0 мг

Състав на обвивката на капсулата: желатин, титаниев диоксид (Е 171), жълт железен оксид (Е 172)

в) ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Капсули

г) ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Нифуроксазид
Чревно противобактериално средство
(A: храносмилателна система и метаболизъм)

2. КОГА ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО

Това лекарство е предназначено за лечение на остра диария от бактериален произход при възрастни и деца над 12 годишна възраст.

Лечението не замества диетата и реhidратация, прием на течности при необходимост.

3. ВНИМАНИЕ

а) КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТОВА ЛЕКАРСТВО

Това лекарство не трябва да се използва в случай на съществуваща алергия към производни на нитрофuran или към някоя от съставките на препарата.

ПРИ СЪМНЕНИЕ, СЕ ОБЪРНЕТЕ ЗА СЪВЕТ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР.

б) СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

* Веднага трябва да се консултирате с лекар в следните случаи:

- ако 2 дни след лечението няма подобрене в симптомите
- при наличие на нарушен общо състояние, треска или повръщане
- наличие на кръв или слуз в изпражненията
- засилена жажда и сухота в устата. Това са признаки за обезводняване на организма, тоест голяма загуба на течности, в резултат от



диарията. В този случай Вашият лекар може да преддели необходимостта от рехидратация, чрез перорално или интравенозно приложение.
Употребата на капсули е противопоказана при деца под 12 годишна възраст.

в) ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Това лечение е допълнение към мерките за диета.

- да се пият много течности (сладки или солени напитки), за да се компенсира загубата на течности, причинена от диарията (средното количество вода за възрастни е два литра);
- да се продължи храненето по време на разстройство:
 - * изключвайки някои видове храна, особено сирови плодове и зеленчуци, салати, зелени зеленчуци, пикантни храни и замразени храни или напитки,
*за предпочитане с ястия на скара, ориз

ПРИ СЪМНЕНИЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ ЗА СЪВЕТ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР.

г) ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ВЪЗМОЖНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЗИМАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЛЕКАРСТВО, ЗА ВСЯКО ДРУГО ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО ПРОВЕЖДАТЕ ТРЯБВА РЕДОВНО ДА ИНФОРМИРАТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

д) БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Не трябва да се използва нифуроксазид по време на бременност и кърмене.

е) ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Лекарството не оказва влияние върху способността за шофирание и работа с машини.

4. НАЧИН НА УПОТРЕБА

а) ДОЗИРОВКА

Спазвайте точно предписаната от лекуващия Ви лекар дозировка.
ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НАД 12 ГОДИНИ.

Дозировката за възрастни е: 1 капсула (200 мг) по 4 пъти дневно.
Деца над 12 години: от три пъти по 1 капсула (200 мг) до четири пъти по 1 капсула (200 мг) дневно, тоест от 600 мг до 800 мг дневно.

б) НАЧИН НА УПОТРЕБА

Приема се през устата.

Капсулите се поглъщат с чаша вода.

в) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УПОТРЕБА

Продължителността на употреба е ограничена до 7 дни.



г) МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПРЕДОЗИРАНЕ

В случай на поглъщане на повече таблетки е необходимо незабавно да уведомите лекуващия Ви лекар.

5. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

ТОВА ЛЕКАРСТВО ПРИ НЯКОИ ХОРА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕДО ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ.

- възможни са алергични реакции — кожни обриви, уртикария, оток на лицето и/или клепачите, езика, алергичен шок.

МОЛЯ УВЕДОМЕТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСЯКА НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЕСПОМЕННАТА В ТАЗИ ЛИСТОВКА.

6. СЪХРАНЕНИЕ

а) да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху външната опаковка

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

6) СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Няма

7. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Synthelabo France

174, avenue de France

75013 Paris, France

8. ПРОИЗВОДИТЕЛ

SYNTHELABO GROUPE

6, Boulevard de l'Europe

21800 QUETIGNY

France

Управление:

SYNTHELABO GROUPE

22 Avenue Galilee

92350 LE PLESSIS ROBINSON

FRANCE

9. Дата на последната редакция на текста

Септември 2001

