

Информация за пациента

ERDOMED
ЕРДОМЕД /Erdosteine/



Erdomed гранули 175 mg / 5 ml – 100 ml; 200 ml

Състав:

Лекарствено вещество: Erdosteine 175 mg / 5 ml

Помощни вещества: захароза, натриев бензоат, натриев нишестен глюколат, аспартам, захарин, натриева сол, портокалова есенция

Лекарствени форми и опаковка:

Флакон от кафяво стъкло с капачка, съдържащ 50 g гранули за приготвяне на 100 ml 3.5 % перорална суспензия.

Флакон от кафяво стъкло с капачка, съдържащ 100 g гранули за приготвяне на 200 ml 3.5 % перорална суспензия.

Фармакотерапевтична група

Муколитик

Втечняващ агент на бронхиални мукози.

Показания

Муколитик, втечнява секретите при остри и хронични заболявания на респираторната система.

Противопоказания

Установена свръхчувствителност спрямо Ердостеина и другите съставки на препарата.

Поради възможно влияние на метаболитите на продукта върху метаболизма на метионина, то Erdomed е противопоказан при пациенти, страдащи от чернодробна цироза и недостатъчност на ензима цистатионин синтетаза.

Erdomed гранули за перорална суспензия, са противопоказани при фенилкетонурия.

Erdomed гранули съдържа захароза, поради което трябва да се прилага с внимание при пациенти, страдащи от диабет.

Поради липса на данни относно безопасността на употребата при бременност и кърмене, Erdomed е противопоказан при бременни и кърмачки.

Нежелани лекарствени реакции

Вследствие приемане на Erdomed не са наблюдавани нито гастро-интестинални, нито системни нежелани лекарствени реакции.

Независимо съобщете на лекуващия лекар при появата на всяка нежелана лекарствена реакция.

Внимание: Не използвайте лекарствения продукт след датата, отпечатана на кутията.


Лекарствени и други взаимодействия

Няма съобщения за взаимодействия с други лекарствени продукти, поради което може да се прилага едновременно с антибиотици, бронходилататори (теофилин или бета-2-миметици, лекарствени средства, подтискащи кашлицата и т.н....).

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Гранулите съдържат захароза. Това трябва да се има предвид при диабет или нискокалорична диета.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.



Дозировка и начин на употреба

Суспензия, пригответа от гранулите 175 mg / 5ml (за деца):

По 5 ml (1 мярка), 2 пъти дневно за деца с тегло от 15 до 19 kg

По 5 ml (1 мярка), 3 пъти дневно за деца с тегло от 20 до 30 kg

По 10 ml 2 пъти дневно за деца с тегло над 30 kg.

В шишето с гранулите се долива вода до специалната линия и се разклаща до пълно разтваряне на гранулите. При необходимост се долива още вода, за да се достигне отново линията и се разклаща повторно.

Готовата суспензия трябва да се използва до 7 дни след пригответянето, ако се съхранява в хладилник.

Преди употреба трябва да се разклаща.

Условия за съхранение

При температура под +25°C.

Приготвеният разтвор за пиене се съхранява до 7 дни при температура +4°C.

Срок на годност

В интактна опаковка: 3 години

Лекарственият продукт не трябва да се употребява след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката.

Пригражател на разрешението за употреба

ЦСЦ Фармасютикъл Лтд - България ЕООД, София 1592, ул. "Асен Йорданов" 10

Производители

Erdomed 3.5 % гранули за перорална суспензия


Edmond Pharma, Paderno Dugnano (MI), S.R.I.Via Cadames 58-20151, Milano-Italy

FULTON medicinali S.p.A., Via Marconi, 228/9 20020 Ares (MI), Italy

"ЦСЦ Фармасютикъл България" ЕООД, ул. "Асен Йорданов" 10, София

Дата на последната редакция на листовката: Юли 2006 г.

311000



Информация за пациента

ERDOMED ЕРДОМЕД /Erdosteine/

Erdomed капсули 150 mg
Erdomed капсули 300 mg
Erdomed сашета 225 mg



Състав:

Erdomed капсули 150 mg

Лекарствено вещество: Всяка капсула Erdomed съдържа 150 mg Erdosteine.

Помощи вещества: повидон, колоидален силиконов диоксид, микрокристална целулоза, желатин, титаниев диоксид (E171), червен железен оксид (E172).

Erdomed капсули 300 mg

Лекарствено вещество: Всяка капсула Erdomed съдържа 300 mg Erdosteine.

Помощи вещества: повидон, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, желатин, титаниев диоксид (E171), жълт железен оксид (E172), индиготин (E132).

Erdomed гранули за перорална употреба – 225 mg

Лекарствено вещество: Едно прахче съдържа Erdosteine 225 mg

Помощи вещества: захароза, натриев бензоат, натриев нишестен глюколат, аспартам, лимонова есенция

Лекарствени форми и опаковка:

Кутия с 20 капсули по 150 mg

Кутия с 10 капсули по 300 mg

Кутия с 20 капсули по 300 mg

Кутия с 20 сашета, съдържащи по 225 mg гранули

Фармакотерапевтична група

Муколитик

Втечняващ агент на бронхиални мукози.

Показания

Муколитик, втечнява секретите при остри и хронични заболявания на респираторната система.

Противопоказания

Установена свръхчувствителност спрямо Ердостеина и другите съставки на препарата.

Поради възможно влияние на метаболитите на продукта върху метаболизма на метионина, то Erdomed е противопоказан при пациенти, страдащи от чернодробна цироза и недостатъчност на ензима цистатионин синтетаза.

Съдържащата аспартам форма – гранулите в сашетата, е противопоказан при фенилкетонурия.

ERDOMED гранули съдържат захароза. Това трябва да се има предвид при страдащи от диабет.

Поради липса на данни относно безопасността на употребата при бременност и кърмене, Erdomed е противопоказан при бременни и кърмачки.

Нежелани лекарствени реакции

Вследствие приемане на Erdomed не са наблюдавани нито гастро-интестинални, нито системни нежелани лекарствени реакции.

Незабавно съобщете на лекуващия лекар при появата на всяка нежелана лекарствена реакция.

Внимание: Не използвайте лекарствения продукт след датата, отпечатана на кутията.



Лекарствени и други взаимодействия

Няма съобщения за взаимодействия с други лекарствени продукти, поради което може да се прилага едновременно с антибиотици, бронходилататори (теофилин или бета-2-миметици, лекарствени средства, подтискащи кашлицата и т.н....).

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Гранулите съдържат захароза. Това трябва да се има предвид при диабет или нискокалорична диета.

Всички лекарствени форми трябва да се съхраняват на места, недостъпни за деца.

Дозировка и начин на употреба

Перорални лекарствени форми:

Капсули 150 mg: По 1-2 капсули се приемат 2-3 пъти дневно.

Капсули 300 mg: По 1 капсула 2-3 пъти дневно.

Сашета 225 mg: По едно саше 2-3 пъти дневно.

Условия за съхранение

При температура под +25°C.

Срок на годност

В интактна опаковка: 3 години

Лекарственият продукт не трябва да се употребява след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката.

Пригожател на разрешението за употреба

ЦСЦ Фармасютикъл Лтд - България ЕООД, София 1592, ул. "Асен Йорданов" 10

Производители

Erdomed капсули 150 mg:

Edmond Pharma s.r.l., Paderno Dugnano (MI), Via Gadames 58-20151, Italy

"ЦСЦ Фармасютикъл България" ЕООД, ул. "Асен Йорданов" 10, София

Erdomed капсули 300 mg:

Edmond Pharma, Paderno Dugnano (MI), S.R.I.Via Cadames 58-20151, Milano-Italy

Famar Italia S.p.A., 20021 Baranzate di Bollate (MI)-Via Zambelli 25, Itali

"ЦСЦ Фармасютикъл България" ЕООД, ул. "Асен Йорданов" 10, София

Erdomed гранули за перорална употреба – 225 mg

Edmond Pharma, Paderno Dugnano (MI), S.R.I.Via Cadames 58-20151, Milano-Italy

"ЦСЦ Фармасютикъл България" ЕООД, ул. "Асен Йорданов" 10, София

Дата на последната редакция на листовката: Юли 2006 г.

311000

