

**ESPERAL**  
**ЕСПЕРАЛ**  
**disulfiram**  
**дисулфирам**

**Лекарствена форма:**

Една опаковка съдържа 20 делими таблетки.

**Състав:**

Една таблетка съдържа 500 мг дисулфирам.

Експириенти q.s. до 1 таблетка.

**Показания:**

Лечение на хроничен алкохолизъм и предотвратяване на усложнения, възникващи по време лечението.

**Механизъм на действие:**

Медикаментът потиска действието на ензим участващ в метаболизма на алкохола в човешкия организъм, при което в повишени концентрации се натрупва продукт, който предизвиква зачеряване на лицето, гадене и повръщане, слабост, сърдебиене, спадане на кръвното налягане. Тези симптоми правят приема на алкохол неприятен.

**Противопоказания:**

- Диабет
- Чернодробна недостатъчност
- Нервно-психични разстройства. Епилепсия
- Коронарна недостатъчност
- Прием на алкохол или медикаменти през последните 24 часа
- Бременност или предстоящо забременяване.

**Предпазни мерки при употреба:**

Есперал не трябва да се приема без лекарско предписание. Лекар трябва да определи необходимата дозировка, продължителността на курса на лечение и да контролира лечението.

Есперал никога не трябва да се дава на пациентите без тяхно знание.

Поради съществуването на риск от възникване на сериозни последствия, Есперал никога не трябва да се предписва на пациенти, които продължават да приемат алкохол или онези пациенти, които са приемали алкохол през последните 24 часа.

**Лекарствени и други взаимодействия:**

- \* По време на лечението се избягва прием на алкохол и медикаменти съдържащи алкохол.
- \* Лечение с изониазид може да предизвика нарушения в координацията и отклонения в поведението.
- \* Метронидазол и сходни препарати могат да предизвикат халюцинации и обърканост.
- \* Есперал потиска метаболизма на фенитоин и може да предизвика интоксикация.
- \* Есперал усилва ефекта на противосъсирващите средства, които се приемат през устата и увеличава риска от кръвоизливи, поради което се налага стриктен лекарски и лабораторен контрол.

**Страницни ефекти**

- \* Метален вкус в устата
- \* Редки случаи на хепатит
- \* Полиневрит на долните крайници, неврит на зрителния нерв
- \* Невропсихични нарушения, смущения в паметта, обърканост, слабост
- \* Главоболие
- \* Кожни алергични реакции

При едновременен прием с алкохол могат да възникнат сериозни усложнения от страна на сърдечно-съдовата и нервната система ( колапс, стенокардия или сърден инфаркт, мозъчен оток или кръвоизлив).

**Приложение и дозировка:**

Приема се през устата. Средната доза е 1 таблетка дневно в началото на лечението. Постепенно дозата се редуцира до 1/2 - 1/4 таблетка дневно. Приема се сутрин по време на закуска.

По време на лечебния курс алкохол не трябва да се приема.

**Срок на годност:**

Да не се приема след изтичане срока на годност обозначен на опаковката.

**Условия на отпускане:**

Този медикамент се отпуска само срещу рецепта.

**Производител:** SANOFI WINTHROP, Франция