

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ...15.06.07...

Листовка за пациента

ЕТАМБУТОЛ-МИЛВЕ
ETHAMBUTOL-MILVE
таблетки 250 mg

Състав:

Всяка таблетка съдържа :

Лекарствено вещество: Ethambutol hydrochloride 250 mg

Помощни вещества: безводен калциев хидрогенфосфат; микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, повидон К-25, талк, магнезиев стеарат, колоиден силициев диоксид.

Лекарствена форма и опаковка: Таблетки по 50 броя в опаковка.

Притежател на разрешението за употреба:

“Фармацевтични заводи Милве” АД,

3200 гр.Бяла Слатина, Промислена зона

Фармакологично действие: Етамбутол-Милве е лекарство с изразена активност спрямо причинителя на туберкулозата. Етамбутолт проявява бактериостатичен ефект по отношение на туберкулозните бактерии и има ранен бактерициден ефект.

Показания:

- лечение на активна белодробна и извънбелодробна туберкулоза, с изключение на очната и бъбречната туберкулоза;
- лечение на първично проявена туберкулозна инфекция;
- химиопрофилактика на туберкулозата в случай на противопоказания към рутинно използваните за това продукти.

Етамбутол-Милве никога не се прилага самостоятелно, а само в комбинация с други туберкулостатици, най-често с изониазид при всички форми на белодробна туберкулоза.

Противопоказания:

- да не се прилага при увреждане на зрителния нерв и други очни заболявания;
- при тежка бъбречна недостатъчност;
- свръхчувствителност към лекарственото и помощните вещества;
- при бременност.

Специални предпазни мерки при употреба:

- да не се прилага в края на деня или преди лягане, тъй като предизвиква безсъние;
- съобщавайте на лекуващия лекар за смущения в зрението по време на лечението с Етамбутол-Милве.

Лекарствени взаимодействия: Уведомявайте лекуващия лекар, когато приемате други лекарства. Ако приемате антиацидни лекарства, съдържащи соли или хидроокиси на алуминия (напр. Алмагел), те трябва да се вземат през интервал повече от 2 часа след приемане на Етамбутол.

Бременност и кърмене:

Посъветвайте се с Вашия лекар ако сте бременна или кърмите.

Да се избягва приемането на Етамбутол при бременност и кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини:

Във връзка с опасността от възникване на смущения в зрението се изисква повишено внимание при шофиране и работа с машини.

Дозировка и начин на употреба: Таблетките Етамбутол-Милве се приемат перорално, независимо от приема на храна. Винаги използвайте Етамбутол точно както Ви е казал Вашия лекар.

Дозировката и продължителността на лечението се определят от лекуващия лекар.

Предозиране: При предозиране или поява на нежелани лекарствени реакции е необходимо да се обърнете към лекуващия лекар или най-близкото лечебно заведение. Прави се стомашна промивка.



Нежелани лекарствени реакции: Макар и рядко прилагането на Етамбутол-Милве може да доведе до увреждане на зрителния нерв с нарушения в червено-зеленото виждане, намалено виждане, ограничаване на зрителното поле. Много по-редки са други странични ефекти - обрив, анафилактичен шок, неврит, по рядко се наблюдават стомашно-чревни смущения, главоболие и хиперурекемия.

Съхранение: Продуктът да се съхранява в оригинални опаковки на сухо, защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

Срок на годност: 2 (две) години. Да не се употребява след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

м.07.2006 г.

