

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 25.09.2006

Информация за пациента

Еукарбон® Таблетки

Състав

1 таблетка съдържа:

Sennae folii (листа от сена)	105 mg
Rhei radix extr. sicc. (екстракт от ревен)	25 mg
Carbo ligni (активен въглен)	180 mg
Sulfur derivatum (пречистена сяра)	50 mg
Помощни вещества:	
Етерично масло от мента	0.50 mg
Етерично масло от резене	0.50 mg

Притежател на разрешението за употреба

F. TRENKA Chem. Pharmazeutische Fabrik Ges. m.b.H., Goldeggasse 5, 1040 Wien

Производител: Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H., A 6060 Absam/Tirol, Austria

Свойства и действие

EUCARBON съдържа само растителни и минерални вещества, регулира червата и има леко слабително действие. То може да се обясни със способността на въглена да се свързва с различни токсични продукти от обмяната на веществата, които се отделят в резултат на слабителното действие на листата от сена и екстракта от ревен. EUCARBON действа също леко дезинфекциращо върху стомашно-чревния тракт. Лекото слабително действие на EUCARBON започва 8-10 часа след приемането му.

Показания

Залек, особено придружен с оплаквания от спазми, подувания, засилено образуване на газове и ленивост на червата.

Начин на приложение и дозировка

Таблетките EUCARBON трябва да се приемат с обилно количество течност, ако не е предписано друго, да се спазва точно дозировката.

Възрастни и деца над 12 години: 1-2 таблетки до 3 пъти дневно по време на хранене или след това за постигане на леко слабително действие и намаляване на подуването. Ако се търси по-силен слабителен ефект, вечерната доза може да се повиши на 3-4 таблетки.

За интензивно прочистване и отвеждане на газовете от стомашно-чревния тракт (преди рентгенологичен преглед и др.): 6-8 таблетки вечер.

Продължителността на лечение не трябва да превишава 2 седмици.

Максимални дневни дози:

8 таблетки за интензивно прочистване и отвеждане на газовете от стомашно-чревния тракт (напр. преди контрастни рентгенови изследвания)

2 x 3 или 3 x 2 (=6) таблетки - за постигане на слабително действие.

При бременност и кърмене е необходимо да се потърси консултация с лекуващия лекар преди да се започне приложение на EUCARBON. Не се препоръчва употребата му през първите 3 месеца от бременността и при кърмене.



Противопоказания

Повишена чувствителност към някоя от съставките на препарата, чревна обструкция, чревни възпаления и болки в корема с неизвестен произход, съмнения за язви на стомаха и червата, възпаление на апендикса. В тези случаи е необходимо консултация с лекар.
Тежки нарушения във водно-електролитното равновесие (калий).
Деца по 12 години.

Взаимодействия с други лекарства

При повишени загуби на калий (недостиг на калий) предизвикани от EUCARBON, може да се засили действието на отделни сърдечни средства (сърдечни гликозиди).
Повишените калиеви загуби могат да се засилят при едновременна употреба с други лекарства - диуретици (обезводняващи), глюкокортикоидни хормони.

Предозиране

Появата на диария в сигурен знак на предозиране. В такъв случай препаратът трябва да се спре и да се потърси консултация с лекар.

Нежелани лекарствени реакции

При приемане в препоръчителната доза рядко се наблюдават нежелани реакции. Наблюдават се отделни случаи на болки в корема, разстройство, рядко гадене или повръщане - те могат да бъдат признак за превишена доза. При приемане във високи дози продължително време може да се стигне до загуба на електролити (най-вече калий), която да се изразява в мускулна слабост и засилен запек. Понякога може да се наблюдава леко жълто или червено оцветяване на урината, което обаче не е клинична значимост.

Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба

Дозата, необходима за сигурно действие, може да бъде индивидуално различна.

Появата на разстройство (диария) е признак за предозиране.

Продължителното приложение на EUCARBON трябва да се избягва. При по-продължителна употреба може да настъпи отслабване на действието.

Хроничната употреба може да доведе до засилване на запек, намален тонус на дебелото черво и водно-електролитни нарушения (намалено ниво на калия в кръвта).

Не се препоръчва приложение на EUCARBON при болни с хемороиди (опасност от кръвоизлив), подагра или оксалатни камъни в бъбреците, поради съдържание на ревен. EUCARBON не трябва да се използва като средство за отслабване.

Ако след прием на лекарството симптомите продължават или състоянието се влоши, обърнете се за съвет към лекар.

Указания за съхранение

Да се съхранява на защитено от светлина място, в оригиналната опаковка.

Да не се използва след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.

Да се съхранява на недостъпно за деца място.

Опаковки

1 блистер x 10 таблетки; 3 блистера x 10 таблетки.

Дата на последна редакция

Октомври 2005

0305-196 444-21.03 2005

