

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като в нея се съдържа важна за Вас информация. Ако искате да научите повече за този продукт или част от информацията в листовката не Ви е ясна, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Alora/Алора
/ Pasiflorae extractum fluidum /

СЪСТАВ:

Всеки 5ml от сиропа **Alora** съдържа 694,444 mg Pasiflorae extractum fluidum.

Помощни вещества: захароза, глицерол, етилов алкохол, метилпарахидроксибензоат, пропилпарахидроксибензоат, пречистена вода.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Alora може да намерите в бутилка от 100 ml, в кутията има мерителна лъжичка с вместимост 5 ml.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

НОБЕЛ ФАРМА ООД

Бул. Симеоновско шосе № 24

София 1700, България

ПРОИЗВОДИТЕЛ

NOBELFARMA İLAC SANAYİİ ve TİCARET A.S.

Sancaklar Koyu, 81100 Duzce, Turkey

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ

Екстрактът от Passiflora е успокоително (седативно) лекарство, което се добива от натуралното растение Passiflora incanata. Като активни съставки съдържа алкалоиди като хармин, арибин и някои флавоноиди като витексин и ориентин.

ПОКАЗАНИЯ

Alora е показан за симптоматично облекчаване на следните състояния:


- тревожност
- нарушения на съня
- нервност
- обща нервна възбуда
- безсъние
- нервност по време на менструация и менопауза

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Alora е противопоказан при пациенти с известна алергия към някои от съставките на продукта.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Трябва да се има предвид централното депресивно действие на медикамента: особено при шофиране и работа с машини, изискваща концентрация на вниманието. Лекарственият продукт съдържа 1,527 mg захароза и не трябва да се прилага при хора с вродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбация или



захарозно/изомалтазен дефицит. Съдържа 11 об.% етанол и трябва да се прилага внимателно в случай, че страдате от чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания или заболявания. В лекарствения продукт се съдържа глицерол, който при високи дози може да причини главоболие, стомашно дразнене и диария. Съдържанието на парахидроксibenзоати рядко може да причини уртикария.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Бременните жени могат да го приемат само след внимателна преценка от лекар.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Съвместния прием със средства подтискащи централната нервна система (като алкохол, барбитурати, транквиланти) може да засили успокоителното (седативното) и хипнотично действие. Приложението заедно с Disulfiram трябва да се избягва. При пациенти употребяващи Aspartame трябва да се наблюдава уринния седимент (=фенилкетонурия).

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО ПРИЕМАТЕ ДРУГИ ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ ИЛИ БЕЗ РЕЦЕПТА !

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

При възрастни:

- за постигане на успокоителен (седативен) ефект през целия ден, трябва да се приемат 5-10 ml (1-2 лъжички) *Aloga* преди основните хранения.
- при нарушения на съня се приемат 10 ml (2 лъжички) *Aloga* преди лягане.

При деца (над 3 годишна възраст):

- Потърсете съвет от Вашия лекар. Количеството на една доза не трябва да надхвърля половин лъжичка.

ПРЕДОЗИРАНЕ

Няма

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

При правилна употреба в посочените терапевтични дози не са наблюдавани нежелани лекарствени реакции. Възможна е проява на свръхчувствителност.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

НАЧИН НА СЪХРАНИЕ

ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ ПОСОЧЕН ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25° C.

Да се пази от пряка светлина.

Регистрационен №:

Дата на последна редакция на листовката: януари 2007 г.

