

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 2912 / 03.09.08
Одобрено: 20 / 08.07.08

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Екзодерил® 1% разтвор Нафтифин /Naftifine

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Екзодерил® и за какво се използва
2. Преди да използвате Екзодерил®
3. Как да използвате Екзодерил®
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Екзодерил®
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕКЗОДЕРИЛ® И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Екзодерил® 1% разтвор е подходящ за лечение на гъбични инфекции и съдържа нафтифин. Активен е срещу кожни гъбички, дрожди, плесени и др. Активен е също срещу различни бактериални инфекции, които често възникват при гъбични инфекции при хора.

За какво се използва Екзодерил®

За лечение на гъбични инфекции на краката, особено между пръстите, долната част на ходилото (различават се като зачервяване, олющване и подуване или сърбящи мехури) и ноктите.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕКЗОДЕРИЛ®

Не използвайте Екзодерил®

- ако сте алергични към нафтифин или пропиленгликол.

Обърнете специално внимание при употребата на Екзодерил®

При първи признаци на нежелани реакции, моля, информирайте Вашия лекар. Не използвайте Екзодерил® разтвор, ако проявите алергия.

Екзодерил® 1% разтвор е само за приложение върху кожата и контакта с очите трябва да се избягва. Не прилагайте разтвора върху отворени рани, тъй като алкохола в съдържанието му може да предизвика болезнено изгаряне.

Ако симптомите продължават да са изяви или лекарството няма очаквания ефект, посъветвайте се с лекар незабавно.



Употреба на други лекарства

Не са известни взаимодействия с други лекарства.

Бременност и кърмене

При правилно приложение, лекарството няма увреждащ ефект върху плода или новороденото.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕКЗОДЕРИЛ®

В случай, че не е предписано друго, следвайте внимателно препоръчителните дозировки. Екзодерил® 1% разтвор се прилага върху засегнатите области веднъж дневно. Тези области трябва да бъдат почистени и подсушени внимателно преди да се нанесе разтвора.

Въпреки бързото подобряване на симптомите (сърбеж, зачервяване и др.) е важно за пациентите с гъбични инфекции на кожата да продължат лечението си за 2 седмици след пълното отшумяване на симптомите, за да предотвратят възобновяването им.

Преди и след лечението на гъбична инфекция, ноктите трябва да се поддържат възможно най-къси, а тяхната повърхност изпилена. Гъбичните инфекции на ноктите трябва да бъдат лекувани в продължение на няколко месеца до израстването на здрав нокът.

За да бъде излекувана гъбичната инфекция (микоза) възможно най-бързо, моля, отбележете следното:

1. Микроорганизмите, причиняващи гъбичната инфекция могат да се прикрепват към части от облеклото, които са в контакт със засегнатите области. Ето защо те трябва да се сменят ежедневно.
2. Нормалната и особено сухата кожна повърхност е най-добрата защита срещу гъбични инфекции. Избягвайте да носите тясно и лошо проветриво облекло (напр. синтетични чорапи и тесни обувки) върху засегнатите участъци. Трябва също да подсушавате засегнатите области внимателно след миене. Кърпите трябва да се сменят ежедневно.
3. Ако имате гъбична инфекция на краката, не ходете боси в къщи, в плувни басейни или напр. в хотел. Така предотвратяване разпространяването на инфекцията на други хора и особено Вашето реинфектиране.
4. Не посещавайте сауна или парна баня докато гъбичната инфекция не се изчисти напълно.

Начин на приложение

Разтворът може да се нанася директно от флакона с помощта на гутатор или върху парче памук.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Локално дразнене като усещане за сухота, зачервяване и затопляне, могат да възникнат в отделни случаи. Нежеланите реакции са винаги обратими и обикновено не изискват прекратяване на лечението. Те отшумяват след края на лечението.

Ако забележите някакви нежелани реакции, неописани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЕКЗОДЕРИЛ®

Съхранявайте продукта при температура под 30 °С.

Не използвайте продукта след срока на годност, означен върху опаковката.



Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Екзодерил®

- Активното вещество е нафтифин хидрохлорид.
- Другите съставки са: пропиленгликол, етанол, дестилирана вода

Как изглежда Екзодерил® и какво съдържа опаковката

Оригинална опаковка, съдържаща 10 ml дермален разтвор.
1 ml разтвор съдържа 10 mg нафтифин хидрохлорид.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Sandoz GmbH, 6250 Kundl, Австрия

Дата на последно одобрение на листовката

Юни 2008

