

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**  
**EZETROL 10 mg Таблетки**

**Ezetimibe**

Към РУ №: 2380	17.09.08
Одобрено: 21 /	29.07.08

Прочетете внимателно съдържанието на тази листовка преди да започнете да приемате това лекарство

- Запазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
- Този лекарствен продукт е предписан на Вас. Не го давайте на други хора. Той може да бъде опасен за тях дори и в случаите, когато симптомите при тях са същите както и при Вас.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява EZETROL и за какво се използва
2. Преди да приемете EZETROL
3. Как да приемате EZETROL
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на EZETROL
6. Допълнителна информация

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EZETROL И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

EZETROL е лекарство, предназначено за понижаване нивата на общия холестерол, "лошия" холестерол (LDL холестерол) и мастни вещества в кръвта, наречени триглицериди. Освен това EZETROL повишава количеството на "добрия" холестерол (HDL холестерол). Прилага се при пациенти, които не могат да контролират стойностите на холестерола единствено чрез диетичен режим. При приема на лекарството следва да продължи диетичния режим за понижаване на холестерола.

EZETROL действа посредством намаляване усвояването на холестерола в храносмилателния тракт. EZETROL не подпомага намалението на телесното тегло.

EZETROL има допълващ ефект към действието на статините, група лекарства, които понижават холестерола, които се произвежда от организма.

EZETROL се прилага като добавка към диетата, ако Ви имате:

- повишено ниво на холестерола в кръвта Ви (първична хиперхолестеролия (хеторозиготна фамилна и не-фамилна)
  - едновременно със статин, когато нивата на холестерола не са добре контролиран единствено със статин
  - самостоятелно, когато лечението със статин не е подходящо или не се понася
- наследствено заболяване (хомозиготна фамилна хиперхолестеролия), което повишава нивото на холестерол в кръвта Ви. Може да Ви бъде предписан статин или други терапевтични средства.



Не приемайте EZETROL със статин, ако сте бременна, опитвате да забременеете или мислите, че може да сте бременна. Ако забременеете докато приемате EZETROL със статин, прекратете лечението незабавно и се свържете в лекаря Ви. Няма данни от приемането на EZETROL без статин по време на бременност. Попитайте лекаря си за съвет, преди да използвате EZETROL ако сте бременна.

Не приемайте EZETROL със статин, ако кърмите, тъй като не се знае дали лекарствата преминават в кърмата. EZETROL без статин не трябва да се употребява ако кърмите. Попитайте Вашия лекар за съвет.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

### **Шофиране и работа с машини**

Не се очаква EZETROL да пречи на способностите Ви да шофирате или да работите с машини. Въпреки това трябва да се има предвид, че някои хора могат да получат световъртеж след приема на EZETROL.

### **Важна информация за някои от съставките на EZETROL**

EZETROL таблетки съдържат захар наречена лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да вземете този лекарствен продукт.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ EZETROL**

Винаги прилагайте EZETROL точно както Ви е казал Вашия лекар. Продължете използването на други лекарствени продукти за понижаване на холестерола, освен ако Вашият лекар не Ви каже да ги спрете. Ако не сте сигурни, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

- Преди да започнете използването на EZETROL, Вие трябва да провеждате диета за понижаване на холестерола
- Вие трябва да продължите тази диета, докато приемате EZETROL.

Дозата е една таблетка EZETROL 10 mg през устата веднъж дневно.

Приемайте EZETROL по едно и също време на деня. Може да се взима с или без храна.

Ако лекарят е предписал EZETROL в комбинация със статин, двата лекарствени продукта може да се приемат по едно и също време. В такъв случай е желателно да прочетете указанията за дозиране на конкретното лекарство, описани в листовката му.

Ако лекарят е предписал EZETROL заедно холестирамин или друг секвестрант на жлъчните киселини (лекарства за намаляване на холестерола), трябва да приемате EZETROL най-малко 2 часа преди или 4 часа след приема на секвестранта на жлъчните киселини.

### **Ако сте приели повече от необходимата доза EZETROL**

Моля свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

### **Ако пропуснете да приемете EZETROL:**



Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако някои от нежеланите лекарствени реакции станат сериозни или забележите нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка.

## 5. СЪХРАНЕНИЕ НА EZETROL?

- Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
- Не използвайте EZETROL след срока на годност, отбелязан върху опаковката.
- Не съхранявайте EZETROL при температура над 30 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка. Това ще предпази продукта от влага.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### Какво съдържа EZETROL

- Активното вещество е езетимиб. Всяка таблетка съдържа 10mg езетимиб.
- Другите съставки са: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, повидон, кроскармелоза натрий, натриев лаурилсулфат, магнезиев стеарат

### Как изглежда EZETROL и какво съдържа опаковката

Таблетките EZETROL са бели до светло кремави, с форма на капсули, с надпис "414" на едната страна.

### Количество в една опаковка:

14 или 28 таблетки

### Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Мерк Шарп и Доум България ЕООД  
бул. Н. Вапцаров 55, ЕКСПО 2000,  
ет. 1, източно крило, сектори Б1 и Б2, София,  
България

Производител:

PCI Services (Cardinal Health)  
Sedge Close, Headway, Great Oakley, Corby, Northamptonshire NN18 8HS  
United Kingdom

Merck Sharp & Dohme  
Shotton Lane, Cramlington, Northumberland NE23 3JU  
United Kingdom

