


FLUIMUCIL® 600
ФЛУИМУЦИЛ 600
(Acetylcysteine)



Състав

Една ефеверсцентна таблетка съдържа:

Лекарствено вещество: Acetylcysteine 600 mg

Помощни вещества: аспартам, лимонена киселина, лимонов аромат, натриев бикарбонат

Лекарствена форма и опаковка

Ефеверсцентни таблетки за перорален разтвор в ленти от алуминий/полиетилен, поставени в картонени кутии, съдържащи 10, 20 или 30 ефеверсцентни таблетки.

Фармакотерапевтична група

Муколитик

Притежател на разрешението за употреба

ЦСЦ Фармасютикъл Лтд - България ЕООД, ул. Асен Йорданов 10, София

Производител

ZAMBON Switzerland Ltd, Via Industria 13, CH-6814 Cadempino, Switzerland

Терапевтични показания

Секретолитична терапия при остри и хронични заболявания на бронхите и белия дроб, свързани с нарушения в образуването и транспорта на бронхиалния секрет, като: остър бронхит, хроничен бронхит и неговите усложнения, белодробен емфизем, муковисцидоза, бронхоектазия.

Противопоказания

Известна свръхчувствителност към Acetylcysteine или към някое от помощните вещества.

Тъй като Flumucil® съдържа аспартам, той е противопоказан при пациенти, страдащи от фенилкетонурия.

Активна язва на стомаха и дуоденума.

Астма.

Под 2 годишна възраст само по витални индикации, след стриктно проследяване от лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Пациентите, страдащи от бронхиална астма трябва внимателно да бъдат наблюдавани по време на терапията: ако се появи бронхоспазъм, лечението трябва да се преустанови незабавно.

Лекарството следва да се приема с внимание от лица в напреднала възраст с респираторна недостатъчност.

Ако голямо количество секрети се втечни, особено при малки деца, и неподвижно болни пациенти, има вероятност от аспириране на секретите.

Acetylcysteine не трябва да се приема от пациенти с намалена способност за отхрачване, освен ако по време на лечението не им бъде приложена аспирация.



Взаимодействие с други лекарства

Acetylcysteine повишава концентрацията на сeфигохиме в бронхиалния секрет.

При използване на лекарствения продукт с лекарства против кашлица може да се появи задържане на секрета в резултат от намаления кашличен рефлекс.

В литературата не са описани случаи на взаимодействия на други лекарства с орално приемания acetylcysteine.

Препоръчва се да не се смесват други лекарства с Fluimucil разтвор.

Пероралното приложение с антибиотици не трябва да съвпада с Fluimucil. Необходимо е минимален интервал от 2 часа между приемите.

Приемане по време на бременност и кърмене

Макар изследвания с Fluimucil върху животни да не показват тератогенен ефект, приемането му по време на бременност и кърмене следва да става, както и при всички други лекарства, само при реална необходимост и под пряко лекарско наблюдение.

Дозировка и прием

Възрастни:

1 ефеверсцентна таблетка Fluimucil 600 mg дневно.

Продължителността на лечението е от 5 до 10 дни при остри състояния и до няколко месеца (1-2 месеца) при хронични състояния (муковисцидоза).

Начин на употреба

Да се приема след хранене. Муколитичният ефект се засилва при прием на течности.

Разтворете съдържанието на една ефеверсцентна таблетка в малко количество вода.

Полученият разтвор е готов за употреба.

Предозиране

При перорален прием не са наблюдавани конкретни признаци или симптоми, дори при лица, лекувани с високи дози acetylcysteine.

При необходимост да се направи бронхоаспирация.

Случаи на предозиране не са известни.

Нежелани лекарствени реакции

Пероралният прием на продукта може в някои случаи да бъде последван от гадене и повръщане и в редки случаи от реакции на свръхчувствителност като уртикария, сърбеж, тахикардия, спад на кръвното налягане, бронхоспазъм.

Много рядко – хеморагии.

При поява на нежелани лекарствени реакции да се преустанови приемането на лекарството.

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА СЛЕД ДАТАТА, ОТПЕЧАТАНА НА КУТИЯТА.

Срокът на годност е валиден за правилно съхраняван продукт в ненарушена опаковка.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.

Последна редакция на текста Август 2005 г.

