

ЛИСТОВКА КЪМ ПРОДУКТА ЛИСТА СЕНА

ЛИСТА СЕНА

Folia Sennae

Количество на лечебното растение: Една опаковка съдържа 40 g листа от сена +/- 10%, 20 дози по ~ 2 g (една супена лъжица).

Лекарствено вещество: Sennae folium.

Лекарствена форма: Билков чай. Herbal tea.

Показания: Като меко слабително средство.

Начин на приготвяне на чая: Една супена лъжица от билката се вари 5 минути в 200 ml вода и се прецежда през марля. Долива се с вода до първоначалния обем (200 ml).

Трайността на извлекa е 12 часа, което налага той да се приготвя ежедневно. Пригответният извлек се съхранява при температура 2° - 8°C в хладилник без да замръзва.

Начин на приемане и дозировка: Отварата се изпива наведнъж, най-добре вечер преди лягане. Очистителният ефект, който е твърде индивидуален, настъпва 6 - 12 часа след приемането на извлекa.

Възрастова схема: За болни

над 14 год.	1 доза	200 ml
от 10 год. до 14 год.	1/2 доза	100 ml

Да не се прилага при деца под 10 години!

Да се приема с богати на калиеви йони храни - банани, кайсии, сини сливи.

Продължителност на лечението: Когато от 6 до 12 часа след приемането на извлекa не настъпва очистителен ефект, да се потърси лекарска консултация. При продължителна употреба е възможно привикване като към всички лаксативи.

Информация при предозирание: При предозирание се наблюдават гадене, повръщане, диария със слуз, метеоризъм, болки в корема, дехидратация, хипотония.

Основни нежелани реакции: Колики, крампи, прояви на свръхчувствителност. Продължителната употреба може да предизвика промени в електролитния баланс.

Противопоказания: При илеус (остра непроходимост на червата), чревна непроходимост, стеноза (стеснение по хода на храносмилателния тракт), атония (загуба на чревния тонус), недиагностициран абдоминален симптом (неизяснен кореман признак), възпаление на дебелото черво, апендицит (възпаление на слепото черво), болки в корема с неясна етиология (произход), тежка дехидратация (обезводняване), хроничен запек, при деца под 10 години, свръхчувствителност.

Употреба по време на бременност и кърмене: Приемането от бременни и по време на кърмене да става само при лекарско предписание и контрол. Да се ограничи употребата в случай, че промени в диетата или фибратните лаксативи (водноразтворими слабителни вещества) не са ефективни. Няма данни за повлияване на кърменето в лечебни дози.

Съхранение: При стайна температура (под 25°C) в сухи, проветриви и защитени от пряка слънчева светлина помещения.

Дата на последна редакция на текста: 08.08.2005 г.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се употребява след изтичане срока на годност!

Парт.№

Годно до:

Произведено от БИЛЕК, гр. Троян, ул. "Бенковски" 1.

Рег.№ 20000394



ЛИСТОВКА КЪМ ПРОДУКТА ЛИСТА СЕНА

ЛИСТА СЕНА

Folia Sennae

Количество на лечебното растение: Една опаковка съдържа 80 г листа от сена +/- 10%, 40 дози по ~ 2 г (една супена лъжица).

Лекарствено вещество: Sennae folium.

Лекарствена форма: Билков чай. Herbal tea.

Показания: Като меко слабително средство.

Начин на приготвяне на чая: Една супена лъжица от билката се вари 5 минути в 200 мл вода и се прецежда през марля. Долива се с вода до първоначалния обем (200 мл).

Трайността на извлекa е 12 часа, което налага той да се приготвя ежедневно. Пригответният извлек се съхранява при температура 2° - 8°C в хладилник без да замръзва.

Начин на приемане и дозировка: Отварата се изпива наведнъж, най-добре вечер преди лягане. Очистителният ефект, който е твърде индивидуален, настъпва 6 - 12 часа след приемането на извлекa.

Възрастова схема: За болни

над 14 год.	1 доза	200 мл
от 10 год. до 14 год.	1/2 доза	100 мл

Да не се прилага при деца под 10 години!

Да се приема с богати на калиеви йони храни - банани, кайсии, сини сливи.

Продължителност на лечението: Когато от 6 до 12 часа след приемането на извлекa не настъпва очистителен ефект, да се потърси лекарска консултация. При продължителна употреба е възможно привикване като към всички лаксативи.

Информация при предозирание: При предозирание се наблюдават гадене, повръщане, диария със слуз, метеоризъм, болки в корема, дехидратация, хипотония.

Основни нежелани реакции: Колики, крампи, прояви на свръхчувствителност. Продължителната употреба може да предизвика промени в електролитния баланс.

Противопоказания: При илеус (остра непроходимост на червата), чревна непроходимост, стеноза (стеснение по хода на храносмилателния тракт), атония (загуба на чревния тонус), недиагностициран абдоминален симптом (неизяснен кореман признак), възпаление на дебелото черво, апендицит (възпаление на слепото черво), болки в корема с неясна етиология (произход), тежка дехидратация (обезводняване), хроничен запек, при деца под 10 години, свръхчувствителност.

Употреба по време на бременност и кърмене: Приемането от бременни и по време на кърмене да става само при лекарско предписание и контрол. Да се ограничи употребата в случай, че промени в диетата или фибратните лаксативи (водноразтворими слабителни вещества) не са ефективни. Няма данни за повлияване на кърменето в лечебни дози.

Съхранение: При стайна температура (под 25°C) в сухи, проветриви и защитени от пряка слънчева светлина помещения.

Дата на последна редакция на текста: 08.08.2005 г.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се употребява след изтичане срока на годност!

Парт.№

Годно до:

Произведено от БИЛЕК, гр. Троян, ул. "Бенковски" 1.

Рег.№ 20000394

