


ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ГАМАФЕРОН®
GAMAFERON®



Състав:

Една ампула лиофилизиран продукт съдържа:

Човешки рекомбинантен интерферон гама	5.10 ⁵ IU/10 µg
Натриев хлорид	45,0 mg
Декстран 40	100,0 mg
Трометамол	1,2 mg

Една ампула разтворител съдържа:

Вода за инжекции	5,0 ml
------------------	--------

Лекарствена форма: капки за очи, прах и разтворител за разтвор.

Лекарствено вещество: 5.10⁵ IU човешки рекомбинантен интерферон гама, разтворен в 5 ml вода за инжекции.

Притежател на разрешението за употреба:

Фармаген ООД
София 1504
Оборище, 9
Тел 943 42 55 (56)

Фармакотерапевтична група или начин на действие:

Човешкият рекомбинантен интерферон гама принадлежи към групата на цитокините. Той стимулира клетъчния имунитет и притежава антивирусно, антибактериално, антипролиферативно и антиалергично действие. Разпределя се равномерно в организма и прониква в клетките чрез рецепторен механизъм.

Показания:

Вирусни заболявания на окото: конюнктивити, кератити, кератоконюнктивити, кератоувеити, причинени от аденовирусни и херпесни инфекции. Може да се прилага профилактично в незасегнатото око при рецидивиращ херпесен кератит и кератоувеит, както и при контактни лица в случаи на аденовирусни кератоконюнктивити.

Противопоказания:

Не са установени.

Специални предпазни мерки:

Не се изискват.

Няма негативно въздействие върху способността за шофиране и работа с машини, но може да влоши зрението ако се постави непосредствено преди шофиране.

Лекарствени взаимодействия:

Синергично антивирусно действие при комбинация с Acyclovir.

Специални предупреждения:

Няма. Не оказва влияние при бременост и кърмене.

Помощните вещества не влияят на безопасността и ефективността на продукта.

Начин на употреба и дозировка:

Ампулата, съдържаща лиофилизиран продукт се отваря и с помощта на приложената в кутията стерилна спринцовка се въвежда разтворът и внимателно се разклаща. Разтвореният продукт се прехвърля отново в ампулата за разтворител (с помощта на същата спринцовка), след което върху нея се поставя приложеният капкомер. От така получения разтвор се накапват 1-2 капки в конюнктивния сак два-три пъти дневно до отзвучаване на инфекцията.

Няма опасност от предозиране. Пропускането на доза не пречи на лечението да продължи.

Нежелани лекарствени реакции:

Не са наблюдавани.

Срок на годност: Три години за лиофилизирания продукт при температура на съхранение под +25°C. След разтваряне срокът на годност е един месец в хладилник при температура от +2° до +8°C. Продуктът да не се използва след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката.

Последна редакция на листовката: декември 2002г.