

Информация за пациента

Уважаеми пациенти, моля прочетете внимателно тази листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар.

Пълнителна агенция по лекарства

Листовка - Приложение 2

Към РУ №: 11-1295 19.12.2007

одобрено: N=3/22.10.2007

Gelomyrtol® / Gelomyrtol® forte
Геломиртол / Геломиртол форте

Какво представлява ГелоМиртол / ГелоМиртол форте ?

ГелоМиртол / ГелоМиртол форте са стомашно-устойчиви капсули по 20, 50, 100 броя в опаковка.

Една стомашно-устойчива капсула ГелоМиртол съдържа:

Активно вещество:

Myrtol Standardized 120mg, включващ минимум 30 mg limonene /лимонен/, 30 mg cineole /цинеол/ и 8 mg α-pinene /пинен/.

Помощни вещества:

Средно-верижни триглицериди, желатин, глицерол 85 %, хипромелоза фталат, дибутил фталат, сорбитол течен (некристализиращ), солна киселина 13 %.

Една стомашно-устойчива капсула ГелоМиртол форте съдържа:

Активно вещество:

Myrtol Standardized 300mg, включващ минимум 75 mg limonene /лимонен/, 75 mg cineole /цинеол/ и 20 mg α-pinene /пинен/.

Помощни вещества:

Рапично масло, желатин, глицерол 85 %, хипромелоза фталат, дибутил фталат, сухо вещество от 70% сорбитолов разтвор (некристализиращ), солна киселина 13 %.

За какво се използва ГелоМиртол / ГелоМиртол форте и как действа?

ГелоМиртол / ГелоМиртол форте се използва за симптоматично лечение на остри и хронични бронхити и синуити.

Геломиртол/ Геломиртол форте повлиява секрецията и кашлицата при заболявания на дихателните пътища, втечнява сгъстения секрет, засилва отделянето му, улеснява отхрачването и има противовъзпалителен ефект.

Кога не трябва да използвате ГелоМиртол / ГелоМиртол форте?

ГелоМиртол / ГелоМиртол форте не трябва да се прилага при свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Какво трябва да имате предвид по време на бременност и кърмене?

Въпреки че липват съобщения за тератогенен ефект по време на бременност, особено през първото тримесечие, ГелоМиртол / ГелоМиртол форте може да се прилага само след консултация с лекар.

Възможно е преминаване на ГелоМиртол в майчиното мляко поради лиофилни свойства.



Какво трябва да знаете при шофиране и работа с машини?

ГелоМиртол/ ГелоМиртол форте няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Специални предупреждения

Съдържа глицерол, който при високи дози може да причини главоболие, стомашно дразнене и диария.

Ако след прием на лекарствения продукт симптомите продължават или състоянието се влоши, да се направи консултация с лекар.

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на ГелоМиртол/ ГелоМиртол форте или могат да бъдат повлияни?

Няма известни взаимодействия с други лекарства или с храни.

Как можете правилно да използвате ГелоМиртол/ ГелоМиртол форте?

Ако не е предписано друго, да се спазват следните указания:

Дозиране на ГелоМиртол

Възрастни и деца над 10 години приемат при остри възпаления по 2 капсули 4-5 пъти дневно; при хронични заболявания се приемат по 2 капсули 3 пъти дневно, като тази дозировка се препоръчва и за поддържаща терапия.

За да се улесни експекторацията сутрин, в случаи на хроничен бронхит, се приема по 2 капсули ГелоМиртол допълнително вечер преди лягане.

Деца от 4 до 10 години приемат половината от дозата за възрастни.

Дозиране на ГелоМиртол форте:

Възрастни и деца над 10 години приемат при остри възпаления по 1 капсула 3-4 пъти дневно; при хронични заболявания се приема по 1 капсула 2 пъти на ден, като тази дозировка се препоръчва и за поддържаща терапия.

При хронични бронхити за улесняване на сутрешното отхрачване се приема по 1 капсула ГелоМиртол форте допълнително вечер преди лягане.

Капсулите ГелоМиртол/ ГелоМиртол форте се приемат $\frac{1}{2}$ час преди хранене с голямо количество хладна течност. За по-добър сън последната доза да се приема преди лягане.

Колко дълго можете да приемате ГелоМиртол/ ГелоМиртол форте?

Продължителността на лечението с ГелоМиртол/ ГелоМиртол форте зависи от оплакванията. При хронични заболявания на дихателните пътища е възможно приемане на медикамента продължително време.

Какво трябва да предприемете, ако сте приели по-голямо количество ГелоМиртол/ ГелоМиртол форте?

Ако сте приели по-голямо количество ГелоМиртол/ ГелоМиртол форте, следните мерки трябва да бъдат предприети от Вашия лекар:

Течен парафин 3ml/kg тегло перорално. При необходимост да се потърси специализирана лекарска помощ.



Какви нежелани реакции може да предизвика ГелоМиртол/ ГелоМиртол форте?

В единични случаи могат да се появят оплаквания в stomашно-чревната област, като подуване, болка, гадене, диария, както и да настъпи раздвижване на намиращи се в жълчката и бъбреците камъни.

В отделни случаи се наблюдават алергични реакции /напр. обриви по кожата, отоци по лицето, задух или нарушения в кръвообъръщението/.

При поява на странични реакции, които не са споменати в листовката, веднага информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Срок на годност

Срокът на годност на продукта е 3 години.

Да не се употребява след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката!

Условия на съхранение

Да се съхранява на сухо място, при температура под 25 °C!

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Притежател на разрешението за употреба

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.
Kieler Strasse 11
D-25551 Hohenlockstedt,
Германия

Производители:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.
Kieler Strasse 11
D-25551 Hohenlockstedt,
Германия

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.
Kaddenbusch 11
D-25578 Dageling,
Германия

Медицинско представителство в България:

Либра ЕАД
Бул. Акад. Стефан Младенов №3,
1700 София

Дата на последна редакция на листовката
Ноември 2007

