

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

GLUCOPRESS 5mg tablets

ГЛЮКОПРЕС 5mg таблетки

Глипизид

**ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА: 8283/04.11.08**

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

- *Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.*
- *Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!*
- *Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.*

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Глюкопрес и за какво се прилага
2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Глюкопрес
3. Как се прилага Глюкопрес
4. Възможни нежелани реакции
5. Условия на съхранение
6. Допълнителна информация

Глюкопрес таблетки

Глипизид

Лекарствено вещество в една таблетка: Глипизид 5 mg

Помощни вещества: манитол, царевично нишесте, натриев нишестен гликолат, коповидон, целулоза микрокристална, талк, магнезиев стеарат

Опаковка

Глюкопрес 10 таблетки в блистер от PVC/алуминиево фолио; 3 блистера в картонена кутия

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГЛЮКОПРЕС И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Глюкопрес е противодиабетно лекарство, което помага за понижаване на кръвната захар от групата на суlfанилурейните противодиабетни средства.

Глюкопрес се прилага за намаляване на кръвната захар при пациенти, страдащи от инсулин-независим захарен диабет, наричен още диабет на злялата възраст или диабет тип II, при който подходящата диета, приложена самостоятелно не е дала резултат.

2. ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С ГЛЮКОПРЕС

Трябва да уведомите Вашия лекар в случай, че:

- Сте алергични към глипизид или някое от помощните вещества;
- Имате I-ви тип диабет;



- Имате наличие на ацетон и захар в урината (диабетна кетоацидоза);
- Имате проблеми с бъбреците или черния дроб;
- Имали сте случаи на загуба на съзнание (диабетна кома);
- Сте бременна, планирате бременност или кърмите;
- Се лекувате с други лекарства;
- Се храните нередовно и употребявате алкохол;
- Се лекувате с инсулин или други лекарства за диабет (сулфанилурейни или бигваниди);

В изброените по-горе случаи това лекарство може да се окаже не подходящо за Вас и Вашият лекар ще се съобрази с това.

Ефектът на всяко подобно лекарство може да намалее с течение на времето. Това явление е известно като вторично неповлияне за разлика от първичното неповлияне, при което продуктът не е имал ефект още при първия прием.

Можете ли да шофирате, докато приемате лекарството

Всички пациенти с диабет, които шофират трябва да внимават да не изпаднат в хипогликемия. В такъв случай не трябва да шофирате и да работите с машини.

Приемане на други лекарства

Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или скоро сте приемали скоро други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар

Лекарства, които взаимодействват с Глюкопрес

- Миконазол и флуконазол, които се използват за лечение на гъбични инфекции;
- Противовъзпалителни лекарства, които се използват за лечение на болки в мускулите и ставите, напр. фенилбутазон;
- Салицилати като ацетизал, които се използват като болкоуспокояващи;
- Алкохол – засилва хипогликемизиращото действие и може да доведе до хипогликемична кома;
- Бета-блокери, които се прилагат за лечение на високо кръвно налягане и определени сърдечни заболявания;
- Инхибитори на ангиотензин-конвертирация ензим, които се използват за лечение на високо кръвно налягане;
- H₂-рецепторни антагонисти, прилагани за лечение на язва, напр. циметидин;
- Кортикоステроиди;
- Фенотиазини, които се прилагат за лечение на някои психични заболявания като хлориromазин;
- Хормонални продукти (прогестагени и противозачатъчни таблетки);
- Лекарства, разширяващи бронхите като салбутамол, ритодрин, тербуталин, които се прилагат при лечение на астма;
- Алкохол (бира, вино, концентрати) може да наруши контрола на кръвната захар;
- Диуретици, калциеви антагонисти, тироидни хормони, изониазид;

3. КАК СЕ ПРИЛАГА ГЛЮКОПРЕС

Винаги приемайте Глюкопрес според инструкциите на лекуващия лекар!

Не взимайте повече таблетки, отколкото Ви е препоръчал Вашия лекар.

Обичайната начална доза е една таблетка от 5 mg. приета преди закуска или обяд.

Ако Вашият лекар прецени, че се нуждаете от по-висока доза, той ще Ви каже как постепенно да я увеличите.

Комбинирана употреба

При добавяне на друго хипогликемизиращо лекарство към Глюкопрес за комбинирана терапия, приложението на новото лекарство трябва да започне с най-ниската препоръчана доза, а пациентите трябва да бъдат наблюдавани внимателно за хипогликемия.

При добавяне на Глюкопрес към друго хипогликемизиращо лекарство приложението на Глюкопрес трябва да започне с 5 mg. Пациенти, които може да са по-чувствителни към хипогликемични лекарства могат да започнат с по-ниска доза. Титрирането трябва да се базира на клинична преценка.

Лечението не трябва да се спира или дозата да се променя без указания от Вашия лекар. Спирането на лекарството може да доведе до влошаване на диабета.

По време на лечението е необходимо периодично да проследявате нивото на кръвната захар. Ако имате някакви въпроси или съмнения, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако изпиете повече таблетки, отколкото е определил Вашия лекар

В такъв случай незабавно трябва да потърсите медицинска помощ. Симптоми като прималяване, объркане, изпотяване или треперене могат да се дължат на ниска кръвна захар. Трябва да изядете или изпиете нещо сладко. При колапс или загуба на съзнание трябва веднага да се повика бърза помощ.

Ако сте пропуснали да приложите Глюкопрес

Ако сте пропуснали да приемете таблетка, вземете я при следващото хранене.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всеки друг лекарствен продукт, Глюкопрес може за предизвика нежелани лекарствени реакции. Ако те са тежки и не преминават трябва да уведомите Вашия лекар!

- Хипогликемия (ниска кръвна захар), която в редки случаи може да бъде тежка. Нейните признания са прималяване, изпотяване, треперене, слабост и объркане. Може да се дължи на недостатъчно хранене или на твърде висока доза на лекарството. Хипогликемията може да бъде коригирана като се изяде или изпие нещо сладко. При възникване на такива признания трябва да уведомите Вашия лекар.
- Стомашно-чревни проблеми като гадене, повъръдане, диария, стомашни болки, запек;
- Треперене;



- Главоболие;
- Кожни проблеми като сърбеж, кожен обрив, уртикария;
- Хепатит, нарушена чернодробна функция;
- Заболявания на кръвта – левкопения (намаляване броя на белите кръвни клетки), хемолитична анемия (намаляване броя на червените кръвни клетки), тромбоцитопения (намаляване броя на кръвните плочки), намаляване броя на всички кръвни клетки;
- Могат да се наблюдават отклонения в някои лабораторни изследвания, които обаче не винаги се дължат на него;
- Жълтеница – много рядка нежелана реакция, при която трябва да уведомите Вашия лекар.
- Реакции на свръхчувствителност – при някои пациенти може да се наблюдават хрипове, обрив и сърбеж по цялото тяло. Ако се появят такива признания трябва веднага да уведомите Вашия лекар!

Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25⁰C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се употребява след срока на годност, указан на опаковката!

Срок на годност: 3 (три) години

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Притежател на разрешението за употреба:

Актавис ЕАД

ул."Атанас Дуков" №29

1407 София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Производител:

Балканфарма Дупница АД

Ул. "Самоковско шосе" №3

2600 Дупница, България

Тел.: 0701 58 196

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД

ул."Атанас Дуков" №29

1407 София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – Ноември 2008

