

ЛИСТОВКА

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 15.06.04г.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ: GRIPEX® (Грипекс)

СЪСТАВ

Една таблетка съдържа:

Активни вещества:

Acetaminophen (Paracetamol)	325.0 mg
Pseudoephedrine hydrochloride	30.0 mg
Dextromethorphan hydrobromide	10.0 mg

Неактивни вещества:

Вътрешност: микрокристална целулоза, прежелатинизирана скорбяла, стеаринова киселина, колоидален силиконов диоксид.

Покритие: хидроксипропил метилцелулоза, полидекстроза, оцветител FD&C Yellow#6 Aluminum Lake, титаниев диоксид, триацетин, оцветител FD&C Red#40 Aluminum Lake, полиетилен гликол.

Импринтинг Инк.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Филм таблетки – 12 таблетки в блистер

Филм таблетки – 2 x 12 таблетки в блистер

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

US Pharmacia International Inc., 996 Hungerford Dr., Suite 3 Bq Rockville, MD 20850,
USA

ДЕЙСТВИЕ

Всяка таблетка съдържа три активни вещества, които са безопасни и със сигурност ефективни. Аналгетично-антиприетичният ацетаминофен (парацетамол) потиска по-леките и умерени болки, главоболие и намалява температурата.

Деконгестантният псевдофефедрин намалява отока на носната кухина, повлиява хремата и подобрява проходимостта на синусите. Декстреметорфан облекчава кашлицата, която се дължи на по-леки раздразнения на гърлото и бронхите, като я потиска. Всички тези симптоми могат да придржават простудата.

ПОКАЗАНИЯ

Грипекс временно облекчава простуда или грип, лека до умерена болка (възпаление на гърлото, главоболие и мускулни болки), температура, оток на лигавицата на носната кухина и синусите, хрема, кашлица.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Този лекарствен продукт не трябва да се предписва на пациенти, с данни за свръхчувствителност към която и да е от съставките и по време на лечение с други лекарствени продукти, съдържащи ацетаминофен, декстреметорфан или псевдофефедрин. Остра бъбречна и чернодробна недостатъчност, остро повиндаване



на кръвното налягане. Остра коронарна болест на сърцето. . Злоупотреба с повече от 90 ml твърд алкохол дневно. Не го предписвайте заедно с моноаминооксидазни инхибитори (МАО) и в продължение на две седмици след неговото спиране. Не трябва да се дава на деца под 6 години.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Хора с бъбречна недостатъчност, пристрастени към алкохол или в недохранено състояние, могат да бъдат изложени на по-голям риск към увреждане на черния дроб. Използвайте предпазливо при пациенти с: бъбречна или чернодробна недостатъчност, лека до умерена степен на повищено кръвно налягане, коронарна болест на сърцето, неравномерен пулс, астма, емфизем, хроничен бронхит, глаукома, хипертрофия на простатата, диабет, хиперириодизъм. По време на лечение да се избягва употребата на алкохол. Ако проявите не изчезнат до 7 дни или са придружени от температура повече от 3 дни, консултирайте се с лекар.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Информирайте вашия лекар за всеки лекарствен продукт, който приемате, включително: хапчета за сън, успокоителни лекарствени продукти, антидепресанти, противоепилептични лекарствени продукти, лекарства против високо кръвно налягане или противосързващи средства.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Не приемайте по време на бременност и кърмене.

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Внимавайте, когато карате моторно превозно средство или работите с машини.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Възрастни и деца над 12 години: 2 таблетки от 3 до 4 пъти на ден. Не приемайте повече от 8 таблетки на ден.

Деца от 6 до 12 години: 1 таблетка от 3 до 4 пъти на ден. Не приемайте повече от 4 таблетки дневно.

ПРЕДОЗИРАНЕ

В случай на предозиране могат да бъдат наблюдавани: гадене, повръщане, коремни болки, сънливост и остра бъбречна или чернодробна недостатъчност. В случай на предозиране, свържете се с вашия лекар. Не по-късно от 10-12 час да се приеме N-ацетилцистеин.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Някои пациенти могат да изпитат умора, сънливост и виене на свят. Други могат да отбележат разстройства от страна на стомашночревната система като гадене, повръщане. Понякога могат да се проявят кожни алергични реакции. В някои случаи пациенти със свръхчувствителност към лекарствения продукт може да се



наблюдава незначително повишаване на кръвното налягане и участена сърдечна дейност.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при стайна температура (15^0,C - 25^0,C). Да се съхранява места, недостъпни за деца.

СРОК НА ГОДНОСТ

2 години.

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА

