

Информация за пациента

Прочетете внимателно цялото съдържание на тази листовка, защото тя съдържа важна информация за пациента

Този лекарствен продукт се отпуска без лекарско предписание, така че пациентът да може да лекува някои заболявания без помощта на лекар. За постигане на добри резултати от лечението, лекарството трябва да се използва внимателно.

Пазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.

Свържете се с Вашия лекар или фармацевт, ако се нуждаете от съвет или допълнителна информация.

Ако симптомите се задълбочат или нямате подобрение след няколко дни, трябва да се свържете с лекар.

Gripex HotActive/ Грипекс ХотАктив

(Paracetamol + Ascorbic acid + Phenylephrine hydrochloride)

Прах за приготвяне на перорален разтвор
(650 mg + 50 mg + 10 mg)/саше 4 g

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 05.12.06

Прах с вкус на лимон

Съдържание:

1 саше съдържа:

активни вещества:

| | |
|-----------------------------|----------|
| paracetamol | 650,0 mg |
| ascorbic acid | 50,0 mg |
| phenylephrine hydrochloride | 10,0 mg |

помощни вещества:

захароза, натриев цитрат, лимонена киселина, ацесулфам К Е950 (acesulpham К Е950), аспартам (aspartame), хидрохиноново жълто(quinoline yellow), натурална лимонена есенция.

Притежател на разрешението за употреба:

US Pharmacia Sp.zo.o 40
Ziębicka Street, 50 - 507
Wrocław Poland

Място на производство:

Wrafton Laboratories Ltd.
Exeter Road, Wrafton, Braunton, North Devon EX33 2DL, UK

Място на допълнително опаковане

US Pharmacia Sp.zo.o 40
Ziębicka Street, 50 - 507
Wrocław, Poland

Предлагани опаковки:

- 5 сашета в картонена кутийка
- 7 сашета в картонена кутийка
- 8 сашета в картонена кутийка
- 10 сашета в картонена кутийка

1. Какво представлява Грипекс ХотАктив и за какво се използва



Грипекс ХотАктив е комбиниран лекарствен продукт с комплексно температуропонижаващо и болкоуспокояващо действие, подходящо за употреба при простудни заболявания. Намалява набъбването на носната лигавица и синусите, възвръща проходимостта на носа и синусите и компенсира недостига на витамин С.

Показания за употребата на Грипекс ХотАктив са симптоми на настинка, грип и грипоподобни състояния, като: треска, тръпки, главоболие, възпалено гърло, мускулни болки, костноставни болки, кихане, възпаление на лигавиците на горните дихателни пътища, общо усещане за дискомфорт..

Грипекс ХотАктив е лекарство за облекчаване на симптомите на настинка, грип и грипоподобни състояния.

2. Преди да се използва Грипекс ХотАктив

Лекарственият продукт не трябва да се използва в случай на:

Данни за свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Поява на някое от следните заболявания: нестабилно коронарно сърдечно заболяване, високо артериално кръвно налягане, фенилкетонурия (повишено отделяне на ацетон и други кетотела с урината), закритоъгълна глаукома. Лечение с инхибитори на моноаминоксидаза и в периода от 2 седмици след спирането на тези лекарства. Да не се приемат други продукти, съдържащи парацетамол и/или симпатикомиметици.

По време на приемането на продукта, консумирането на алкохол е забранено.

Лекарството не трябва да се използва при деца под 12 години.

Внимавайте особено много с употребата на Грипекс ХотАктив, ако:

Имате чернодробна или бъбречна дисфункция, бронхиална астма, хипертрофия на простатата, хипертиреозидизъм (прекомерно образуване на тиреоидни хормони вследствие на увеличена функция на щитовидната жлеза), синдром на Рейно, коронарно сърдечно заболяване, артериална хипертония, диабет.

В случай на температура, продължила повече от 3 дни след началото на лечението, трябва да се консултирате с лекар.

Едно саше съдържа 1.981 g захароза, което се равнява на 0.2 калории, което трябва да се има пред вид от диабетици.

Приемане на лекарствения продукт с храни и напитки.

Храната не намалява резорбцията на лекарството от организма.

Бременност и кърмене

Лекарственият продукт може да се прилага при бременни жени, само в случай, че ползите за майката са по-големи от потенциалния риск за плода.

Лекарството не трябва да се употребява по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини:

Когато приемате това лекарство трябва да внимавайте при шофиране и работа с машини.

Употреба на други лекарствени продукти:

Продуктът не трябва да се приема едновременно с други лекарства, съдържащи парацетамол и/или фенилефрин, инхибитори на моноаминоксидазата, зидовудин (zidovudine).

В случай, че приемате антитромботични лекарствени продукти (варфарин, кумарин), антиепилептични лекарства, барбитурати, средства за намаляване на кръвното налягане (гванетидин, мекамиламин, метилдопа, резерпин), индометацин, В-рецепторни антагонисти, трициклични антидепресанти, преди да вземете лекарството, консултирайте с Вашия лекар.

3. Как се приема Грипекс ХотАктив?



Възрастни и деца над 12 години:

1 саше на всеки 4-6 часа (максимум 4 сашета дневно). Съдържанието на сашето трябва да се разтвори в чаша с гореща вода, за да се получи топла напитка.

Ако имате усещането, че действието на този лекарствен продукт е твърде силно или твърде слабо, трябва да се консултирате с лекар.

Ако пропуснете да приемете дозата:

Грипекс ХотАктив е показан за облекчаване на симптомите на настинка, грип и грипоподобни състояния и трябва да се приема, като се спазва препоръчителната доза.

Ако приемете повече от лекарствения продукт, отколкото трябва:

Ако не е изминал повече от 1 час след предозирането, трябва да се предизвика повръщане или да се направи промивка на стомаха.

Възможно е да се появят гадене, повръщане, диария, болки в стомаха, жълтеница, треперене, безпокойство, безсъние, повишено артериално кръвно налягане, сърцебиене, бледност, затруднено уриниране. Най-опасните симптоми на предозиране са: задух, халюцинации, гърч и кома.

Ако сте използвали това лекарство в доза, по-висока от препоръчителната, свържете се незабавно с Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Като всяко лекарство Грипекс ХотАктив може да предизвика нежелани реакции. Включително:

- кожни алергични реакции (сърбеж, уртикария)
- от страна на храносмилателната система: гадене, повръщане, нарушено храносмилане, чувство на парене
- от страна на сърдечносъдовата система: повишаване на артериалното кръвно налягане, сърцебиене, аритмия, побледняване.
- от страна на пикочната система: затруднено уриниране
- от страна на централната нервна система: чувство за страх, безпокойство, нервно напрежение, безсъние, халюцинации

При някои хора, по време на приложение на лекарството може да се появят и други нежелани реакции. Ако забележите страничен ефект, който не е споменат в тази листовка, трябва да информирате Вашия лекар.

5. Съхранение на Грипекс ХотАктив

Лекарството трябва да се съхранява на недостъпно за деца място.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да не се използва след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.

Ако имате въпроси или се съмнявате в нещо, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последна редакция на текста:

