

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ХЕПКАРСИЛ® ФОРТЕ 90 mg твърди желатинови капсули
HEPCARSIL® FORTE 90 mg capsules, hard

(Silybi mariani fructus extractum siccum, equivalent to 90 mg Silymarin)
(Сух екстракт от плодове на Бял трън, съответстващ на 90 mg Силимарин)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Хепкарсил Форте и за какво се използва
2. Преди да приемете Хепкарсил Форте
3. Как да приемате Хепкарсил Форте капсули
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хепкарсил Форте капсули
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №:	3681, 04.12.08
Одобрено: N=8/24.11.2008	

1. Какво представлява Хепкарсил форте и за какво се използва?

Хепкарсил форте е лекарствен продукт, чиято активна съставка силимарин има растителен произход. Действа стабилизиращо върху клетъчните мембрани на чернодробните клетки, възстановява тяхната структура и стимулира обмяната на веществата в тях и по-специално тази на белтъците и въглехидратите (гликоген и гликопротеини). В резултат на това действие, Хепкарсил форте значително подобрява нарушените чернодробни функции.

Хепкарсил форте се прилага за симптоматично лечение на хронични токсични чернодробни увреждания. За поддържащо лечение при пациенти с хронични възпалителни заболявания на черния дроб и чернодробна цироза.

2. Преди да приемете Хепкарсил форте

Не приемайте Хепкарсил форте

- ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на Хепкарсил форте.

Обърнете специално внимание при употреба на Хепкарсил форте

- Да не се употребява при деца под 12 год., поради липсата на данни за безопасност при тази възрастова група.



- Когато приемате лекарството, трябва да се избягват причините за увреждане на черния дроб, като употреба на алкохол.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. До момента не са известни неблагоприятни взаимодействия с други лекарства.

Прием на Хепкарсил с храни и напитки

Не са известни взаимодействия с храни и напитки.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Само Вашият лекар може да прецени необходимостта от лечението при такива състояния.

Шофиране и работа с машини

Хепкарсил форте не повлиява активното внимание и рефлексите при шофиране и при лица, работещи с машини.

3. Как да приемате Хепкарсил форте

Винаги приемайте Хепкарсил форте точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната Доза е 3 пъти по 1 капсула дневно. Капсулите се приемат несдъвкани с малко течност.

При по-тежки случаи, по препоръка на лекаря, продуктът може да се приема в по-висока доза.

Продължителността на лечебния курс се определя от лекуващия лекар.

Ако оплакванията продължат, да се потърси отново лекарски съвет.

Ако сте приели повече от необходимата доза Хепкарсил форте

При редки случаи, нежеланите лекарствени реакции могат да се появят в засилена форма. В такива случаи да се потърси лекуващият лекар за симптоматично лечение.

Ако сте пропуснали да приемете Хепкарсил форте

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Възстановете обичайната си схема.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, Хепкарсил форте може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В отделни случаи е наблюдавано леко слабително действие, болки в стомаха, диспепсия, подуване на корема, гадене.

Възможни са алергични реакции, проявени с обрив и сърбеж.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Хепкарсил форте?

Съхранявайте Хепкарсил форте в оригинални опаковки сухо и защитено от светлина място, при температура под 25 °С.



Съхранявайте на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

3 (три) години от датата на производство.

Не използвайте Хепкарсил форте след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6. Допълнителна информация

Активното вещество е: сух екстракт от плодове на бял трън 140–180 mg. Съответстващ на 90 mg. Силимарин.

Другите съставки са: лактоза, повидон, талк, колоидален безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат.

Състав на капсулната обвивка: азорубин(E122), патентно синьо, титанов диоксид (E 171).

Как изглежда Хепкарсил форте и какво съдържа опаковката

10 капсули в блистери от PVC/ алуминиево фолио

4 броя блистери в картонена кутия

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

МЕДИКА АД

Бул. "Княз Ал. Дондуков" № 82

СОФИЯ 1504

Телефон 9600330

E-mail: sofia@medica.bg

ПРОИЗВОДИТЕЛ

МЕДИКА АД

Индустриална зона

Сандански, 2008

Телефон 0746/34220

E-mail: info@medica.bg

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Ралица Савова Тишкова

Пл. Папа Йоан Павел II № 1

София 1164

Тел.: 9600353

E-mail: rtishkova@medica.bg

Дата на последно одобрение на листовката

м. юни 2008 г.

