

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

HEXORAL® oromucosal solution

ХЕКСОРАЛ разтвор за устна лигавица

Hexetidine (хексетидин)

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват 10 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Хексорал и за какво се използва
2. Преди да използвате Хексорал
3. Как да използвате Хексорал
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хексорал
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХЕКСОРАЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Хексорал разтвор принадлежи към група лекарства с антимикробно и противогъбично действие (антисептици) и е ефективен срещу повечето болестотворни микроорганизми в устата и гърлото.

Хексорал разтвор се използва за:

- като поддържащо локално лечение
- на възпалителни и инфекциозни заболявания на устата и гърлото,
- на тежки гнойни заболявания на устата и гърлото, протичащи с фебрилитет и изискващи лечение с антибиотици или сулфонамиди;
- за предотвратяване на суперинфекция;
- преди и след хирургически интервенции в областта на устата и фаринкса;
- за устна хигиена в случай на общи заболявания;
- против лош дъх, специално при тумори в разпад в устата и гърлото;
- като допълнително средство при лечение на простудни състояния.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХЕКСОРАЛ

Не използвайте Хексорал

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към хексетидин или към някоя от останалите съставки на Хексорал.
- Хексорал разтвор трябва да се използва само за изплакване и гаргара, ако пациентът може да изплюе разтвора.
- при деца под 3 години

Обърнете специално внимание при употребата на Хексорал

- Хексорал не трябва да се използва продължително време. Ако симптомите са персестират повече от 10 дни, лечението трябва да се прецени отново.
- Хексорал не трябва да се поглъща поради съдържанието на етилов алкохол (1 об. %).
- Поради наличието на терпентинови производни в помощните вещества, се препоръчва внимание при пациенти с епилепсия.



Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Не се препоръчва едновременната или последователна употреба на други антисептици.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. До момента не са известни нежелани ефекти при приложението на разтвора Хексорал по време на бременност и кърмене.

Хексорал разтвор трябва да се използва при бременност само след строга преценка на съотношението полза/риск, тъй като няма достатъчно налични данни за преминаването през плацентата и екскрецията на субстанцията в кърмата.

Шофиране и работа с машини

Хексорал не повлиява способността за шофиране и работа с машини

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХЕКСОРАЛ

Възрастни и деца на 6 и повече години:

При заболявания на устната кухина се прави изплакване с 10 – 15 ml от Хексорал за около половин минута, а при заболявания на фаринкса – гаргара със същото количество Хексорал в продължение на половин минута.

Ако не е предписано друго, се прилага 2 пъти дневно за предпочитане сутрин и вечер след хранене. В някои случаи Хексорал може да се прилага и по-често.

Хексетидин полепва по лигавицата и така оказва своето продължително действие. Затова Хексорал трябва да се прилага след хранене.

Продължителността на лечение не трябва да превишава 10 дни. По-продължителен курс на лечение може да се определя от лекар.

Деца от 3 до 6 години:

Както е предписано от лекуващия лекар.

Деца под 3 години:

Приложението на това лекарство не е препоръчително в тази възрастова група.

Хексорал е подходящ за приложение само в устата и гърлото, затова не трябва да се поглъща.

Продуктът под формата на разтвор трябва да се прилага внимателно при деца между 3- и 6-годишна възраст поради това, че децата в тази възраст трудно могат да правят гаргара и съществува възможност за поглъщане на лекарството.

Ако сте приели повече от необходимата доза Хексорал

Концентрацията хексетидин в Хексорал не токсична, когато се използва както се препоръчва.

Ако се погълне, острата интоксикация от помощното вещество етилов алкохол и сходна с интоксикацията, наблюдавана при поглъщането на големи количества етилов алкохол.

Поглъщането на големи количества може да доведе до повръщане.

Ако сте пропуснали да използвате Хексорал

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Хексорал разтвор може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.



В някои случаи могат да се наблюдават алергични реакции (реакции на свръхчувствителност), алергични контактни дерматити, усещане за парене, слаб локален анестетичен ефект, промяна на вкуса.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ХЕКСОРАЛ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Хексорал разтвор след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°C.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Хексорал

– Активното вещество е хексетидин 100 mg
Другите съставки са: анасоново масло, лимонена киселина монохидрат, етанол (96%), левоментол, метилсалицилат, карамфилово дърво, масло от цвят, лютив мента, масло, полисорбат 60, захарин натрий, пречистена вода, азорубин (85%) Е 122, евкалиптово масло. Съдържа 5,1 об. % алкохол (етанол).

Как изглежда Хексорал и какво съдържа опаковката

Опаковка с една стъклена бутилка хидролитичен клас III, съдържаща 200 ml разтвор и мерителна чашка 15 ml.

Притежател на разрешението за употреба

PFIZER EUROPE MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich, Kent
Англия CT13 9NJ

Производител

Pfizer PGM GmbH
5 avenue de Concorde
45071 Orleans Cedex 2
Франция

Дата на последно одобрение на листовката {мм /гггг}.

