

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Hexoraletten N
Хексоралетен Н
Таблетки за смучене
Chorhexidine (хлорхексидин); benzocaine (бензокаин)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА КАРТА ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Приложение 2	
№	1-18 09 / 26.03 08
Одобрено	10 / 18.12.07

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Хексоралетен Н и за какво се използва
2. Преди да приемете Хексоралетен Н
3. Как да приемате Хексоралетен Н
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Хексоралетен Н
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХЕКСОРАЛЕТЕН Н И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Хексоралетен Н са таблетки за смучене, предназначени за локално приложение с цел намаление (редукция) на броя на микроорганизмите в гърлото и устната кухина при възпалено гърло, стоматит (възпаление на устната кухина), гингивит (възпаление на венците).

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ХЕКСОРАЛЕТЕН Н

Не приемайте ХЕКСОРАЛЕТЕН Н

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към хлорхексидин или бензокаин или към някоя от останалите съставки на Хексоралетен Н.
- ако имате рани и разязвявания на устата и гърлото
- ако са Ви установявани ниски нива на плазмената холинестераза
- да не се дава при деца под 4 г.

Обърнете специално внимание при употребата на ХЕКСОРАЛЕТЕН Н

- ако сте диабетик
- когато приемате лекарства от групите на сулфонамидите или аminosалицилатите
- ако имате увреждания на лигавицата на устата (ранички, залющвания)

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали лекарства от групата на сулфонамидите или аminosалицилатите. Бензокаин намалява ефекта на тези лекарства.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. До момента не са известни противопоказания за приложението на лекарството по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Хексоралетен Н не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Хексоралетен Н

1 таблетка за смучене отговаря на 0.1 хлебна единица.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ХЕКСОРАЛЕТЕН Н

Възрастни и деца над 12 години:

Няколко пъти на ден по 1 таблетка за смучене. При нужда може да се смуче по една таблетка на всеки 1 – 2 часа до максимална доза от 8 таблетки за смучене дневно.

Деца (4 – 12 години):

До 4 таблетки за смучене на ден.

Деца под 4 години:

Не трябва да се прилага в тази възрастова група.

Таблетките за смучене се държат в устата, докато се разтворят.

Забележка за диабетици: Съдържанието на въглехидрати в една таблетка за смучене съответства на 0,1 хлебна единица.

Лечението трябва да започне по възможност веднага след появата на първите симптоми и да продължи няколко дни като превантивна мярка след отзвучаване на оплакванията.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Хексоралетен Н може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

При продължителна употреба е възможно да се появи преходна промяна на вкуса и чувство на скованост на езика.

Продължителната употреба на лекарства, съдържащи хлорхексидин, може да доведе до оцветяване на зъбите, което може да се почисти с паста за зъби; възможно е също и обратимо оцветяване на езика.

Бензокаин може да предизвика реакции на свръхчувствителност, в редки случаи до анафилактичен шок.

При прилагане на бензокаин са наблюдавани промени в хемоглобина (метхемоглобинемия) при малки деца.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ХЕКСОРАЛЕТЕН Н

Съхранявайте на място недостъпно за деца.

Не използвайте Хексоралетен Н след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Хексоралетен Н

- Активните съставки са хлорхексидин хидрохлорид и бензокаин
- Другите съставки са: масло лютива мента, ментол, тимолол, аспартам, изомалт, вода



1 таблетка за смучене отговаря на 0.1 хлебна единица.

Как изглежда Хексоралетен Н и какво съдържа опаковката

Опаковки с 2 блистера съдържащи 10 таблетки за смучене/блистер.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

PFIZER EUROPE MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent

Англия CT13 9NJ

Производител:

Godecke GmbH

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Германия

Дата на последно одобрение на листовката {мм /гггг}.

