


**ПРИЛОЖЕНИЕ II**



1

**ЛИСТОВКА**

**Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна информация.**

- Това лекарство се отпуска без рецепта.
- Ако симптомите Ви продължават, влошават се или се появяват нови, трябва да потърсите консултация с медицински специалист.
- Запазете тази листовка, защото може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате нужда от повече информация и съвет, попитайте фармацевт.

**1. НАИМЕНОВАНИЕ**

**HUMEXCOUGH Adults, syrup**  
**ХЮМЕКСКОФ за възрастни, сироп**

**2. СЪСТАВ**

*Лекарствено вещество:*

Carbocisteine ..... 5.000 g  
за 100 ml сироп

*Помощни вещества:*

Натриев метил парахидроксibenзоат, разтвор на натриев хидроксид, аромат на карамелов пунш, лимонена киселина монохидрат, разтвор на захароза, пречистена вода.

Една доза (1 супена лъжица от 15 ml ) съдържа 750 mg Carbocisteine и 5 g захароза.

**3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА**

Сироп; бутилка от 125 ml.

**4. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА:**

Laboratoires URGO, 42, rue de Longvic - 21300 CHENOVE, FRANCE

**5. ПРОИЗВОДИТЕЛ**

Laboratoires URGO, 9 rue Petitot – 21 000 DIJON, FRANCE

**6. ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА**

МУКОЛИТИЧНО СРЕДСТВО АТС: R05CB

**7. КОГА ДА УПОТРЕБЯВАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО**

Това лекарство е показано за краткотрайно лечение на дихателно заболяване, започнало наскоро и свързано със затруднения в експекторацията (затруднения в отхрачването) при възрастни (над 15-годишна възраст).

**8. ВНИМАНИЕ ! ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ УПОТРЕБА.**

**• Противопоказания**

Не трябва да употребявате това лекарство, ако сте алергични към някоя съставка.

**АКО ИМАТЕ СЪМНЕНИЯ, ПОСЪВЕТВАЙТЕ СЕ С ЛЕКАР ИЛИ С ФАРМАЦЕВТ.**



- **Специални предупреждения**

**ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.**

**НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПОСЪВЕТВАТЕ С ЛЕКАР В СЛУЧАЙ НА:**

- Силно отделяне на хрячки, инфектирани хрячки и висока температура;
- Ако имате хронично бронхиално или белодробно заболяване;
- Язва на стомаха и дванадесетопръстника.

Тъй като това лекарство съдържа захароза, то не трябва да се използва в случай на непоносимост към фруктоза, глюкоза и синдром на малабсорбция на галактоза или в случай на недостиг на захараза-изомалтаза (редки обменни заболявания).

- **Предпазни мерки при употреба**

Това лечение трябва винаги да се съпровожда със съзнателно усилие за откашляне, за да може да се отделят хрячките.

Не комбинирайте Carbocistein с други лекарства, предназначени да подсушат бронхиалната секреция.

Ако сте диабетик или спазвате диета с ниско съдържание на захар, имайте предвид, че всяка супена лъжица от 15 ml от това лекарство съдържа 5 g захароза.

**ВАЖНО Е ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ЛЕКАР, КОГАТО ЛИПСВА ПОДОБРЕНИЕ.**

- **Лекарствени взаимодействия**

**ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ВЪЗМОЖНИ ВРЕДНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ НЯКОЛКО ЛЕКАРСТВА, МОЛЯ УВЕДОМЯВАЙТЕ ФАРМАЦЕВТА ИЛИ ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР ЗА ВСЯКО ДРУГО ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО ПРОВЕЖДАТЕ.**

Този лекарствен продукт съдържа Carbocisteine. Други лекарства може също да съдържат това лекарствено вещество. Внимавайте да не комбинирате тези лекарства, защото може да надхвърлите препоръчаните максимални дози (виж: Дозировка и метод на приложение).

- **Бременност и кърмене**

Моля, посъветвайте се с лекуващия си лекар или с фармацевт преди да вземете това лекарство.

- **Шофиране и работа с машини**

Няма данни за влияние

- **СПОРТ**

Няма данни за влияние

- **Помощни вещества, които някои пациенти трябва да знаят, за да използват този продукт без риск.**

Този лекарствен продукт съдържа:

- Захароза. Когато се приема, съгласно препоръките за дозиране, всяка доза (1 супена лъжица от 15 ml) набавя до 5 g захароза. Неподходящ при хора с вродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарозно/изомалтазен дефицит.



- Натриев метил парахидроксibenзоат. Известно е, че причинява уртикария

## 8. КАК ДА СЕ ПРИЛАГА ТОВА ЛЕКАРСТВО

- **Дозировка и метод на приложение**  
САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ (над 15-годишна възраст).

Приема се през устата.

1 супена лъжица от 15 ml - 3 пъти дневно, за предпочитане на гладно.

- **Продължителност на лечението**

Продължителността на лечение е ограничена до 5 дни!

- **Предозиране**

При случайно предозиране СПРЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО И НЕЗАБАВНО УВЕДОМЕТЕ ЛЕКАР.

- **Ако сте пропуснали да вземете лекарството**

Не вземайте двойна доза, заради пропуснатата единична доза.

## 9. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

*ПРИ НЯКОИ ХОРА ТОВА ЛЕКАРСТВО МОЖЕ ДА ИМА НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, КОИТО ПРИЧИНЯВАТ ДИСКОМФОРТ:*

Възможни са храносмилателни оплаквания: гадене, повръщане, диария.

**В такъв случай е препоръчително да намалите дозата.**

*НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА УВЕДОМИТЕ ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСЯКА НЕЖЕЛАНА ИЛИ НЕПРИЯТНА РЕАКЦИЯ, КОЯТО НЕ Е СПОМЕНАТА В ТАЗИ ЛИСТОВКА.*

## 10. СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте при температура под 25°C.

## 11. СРОК НА ГОДНОСТ

Не употребявайте след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

## 12. Последна редакция на листовката: 01.08.2001

