

RGD: 49932/E/3

RGD: 49011/H/3

HYALURICHT® (ХИАЛУРИХТ®) гел

Цинков хиалуронат

Моля, прочетете внимателно тази информация преди употреба на препарата.

Активно вещество

Zinc hyaluronate 15.40 мг в 15 г гел.

Помощни вещества: potassium sorbate, sodium hydroxide, carbomer.

Действие

Цинковият хиалуронат играе важна роля за предотвратяване развитието на пъпки и при лечението на акне.

Има също противовъзпалително и антисептично действие.

Показания

Всички видове пъпки в лека или умерено тежка степен, главно за локално лечение на комедони и гнойни пъпки.

Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките на препарата.

Предупреждения

Само за външна употреба!

Препаратът не предизвиква фотосенсибилизация, не зацапва кожата или облеклото.

Лекарството да се съхранява на недостъпно за деца място!

Лекарствени взаимодействия

Не са известни досега.

Дозировка

След грижливо почистване на засегнатата област, трябва да се нанесе тънък слой от препарата два пъти дневно върху кожата. Прониква в кожата до няколко минути и не е необходима превръзка.

Нежелани реакции

В началото на лечението може да се появи преходно чувство за парене и зачервяване на кожата. При пациенти със суха кожа може да се наблюдава усещане за опъване на кожата. В случай на поява на неочаквани и непознати досега симптоми трябва да информирате Вашия лекуващ лекар.

Съхранение

Да се съхранява при температура 15-30°C. Да се използва в срока на годност, отбелязан на опаковката.

Производител

Химически завод Гедеон Рихтер АД
Будапеща - Унгария

Дата на последна редакция: