

ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ибупром Спринт Капс 200 mg капсули

Ibuprofen Sprint Caps 200 mg capsules, soft

Ибупрофен (Ibuprofen)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
КЪМ РУ №:	П-5132, 08.06.09
Одобрено:	18/3.06.08

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 5 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт

В тази листовка :

1. Какво представлява Ибупром Спринт Капс и за какво се използва
2. Преди да използвате Ибупром Спринт Капс
3. Как да приемате Ибупром Спринт Капс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ибупром Спринт Капс
6. Допълнителна информация за Ибупром Спринт Капс

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИБУПРОМ СПРИНТ КАПС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Ибупром Спринт Капс е аналгетичен лекарствен продукт, който действа едновременно на централно и периферно ниво. Той се използва за лечение на възпалително състояние, което е една от причините за болката (периферно действие). Продуктът ефективно понижава температурата (централно действие). Показан е за лечение на лека до умерена болка от различен произход, включително: главоболие, зъбобол, мускулна болка, болка в кръста, болка в костите и ставите. Дисменорея (болка при менструация). Висока температура.

Да се използва възможно най-кратко време във възможно най-ниската терапевтична доза! Да се използва не повече от 3 дни като температуропонижаващо и 5 дни като болкоуспокояващо средство без лекарско предписание.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИБУПРОМ СПРИНТ КАПС

Не използвайте Ибупром Спринт Капс ако:



- В миналото са се проявили симптоми на алергия към някоя от съставките, както и свръхчувствителност /хрема, астматичен пристъп, уртикария/ към ацетилсалицилова киселина или друг лекарствен продукт от групата на НСПВС.
- При следните състояния: активна или скорошна стомашна и/или дуоденална язва, предразположение към кръвоизливи, тежка чернодробна и/или бъбречна недостатъчност, тежка сърдечна недостатъчност. Трети триместър на бременността.

Този продукт не трябва да се прилага при деца под 12 години.

Обърнете специално внимание при употребата на Ибупром Спринт Капс

- ако в анамнезата Ви има данни за бронхиална астма, нарушения на кръвосъсирването, увреждане на черния дроб и/или бъбреците, артериална хипертония или стомашна и/или дуоденална язва;
- ако едновременно се лекувате с други НСПВС;
- при бременност и по време на кърмене.

Лекарства като Ибупром Спринт Капс могат да бъдат свързани с леко увеличен риск от сърдечен инцидент (миокарден инфаркт) или инсулт. Всеки риск е вероятен при високи дози и продължително лечение. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението - 5 дни.

Ако имате прекаран инсулт, проблеми със сърцето или мислите, че за вас може да има риск от появата им (например ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол, или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.

Употреба на други лекарства

Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако употребявате или сте употребявали доскоро други лекарствени продукти, дори и такива, отпускани без рецепта.

Едновременната употреба с други НСПВС може да доведе до засилване на нежеланите реакции. Трябва да се потърси мнението на лекар преди да се приложи този продукт, когато ще се използва едновременно с кортикостероиди, орални антикоагуланти /варфарин, кумарин/, лекарства, понижаващи кръвното налягане, диуретици, литий, метотрексат или зидовудин. Пациенти със заболяване на коронарните артерии, лекувани с ацетилсалицилова киселина, също трябва да се консултират с лекар преди да използват ибупрофен.

Употреба на Ибупром Спринт Капс с храни и напитки

Резорбцията му не се намалява от храната. Трябва да се приема след хранене.

Бременност

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете лекарствения продукт. Той не трябва да се употребява в третия триместър на бременността.

Употребата от бременни е позволена само, когато е препоръчана от лекар.

Кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемате продукта. Ибупрофен преминава в кърмата в много малки количества и рискът да увреди кърмачето е малък.



Шофиране и работа с машини

Лекарственият продукт не влияе върху способността за шофиране и работа с машини. Да се има в предвид, че при употребата му може да се получи замайване.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ИБУПРОМ СПРИНТ КАПС

Възрастни и деца над 12 години :

За краткотрайно, незабавно лечение: орално 1-2 капсули на всеки 4-6 часа (не повече от 6 капсули дневно), приети след хранене.

Не трябва да се използва от деца под 12 години.

При пациенти в напреднала възраст не се налага адаптиране на дозата.

Ако имате впечатление, че ефектът на този лекарствен продукт е много силен или много слаб, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Ибупром Спринт Капс

Може да се появи силно гадене, повръщане, главоболие, световъртеж, коремна болка, сънливост, сърдечни аритмии, понижаване на кръвното налягане, метаболитна ацидоза, треска, дихателни нарушения и функционални бъбречни нарушения.

Ако сте използвали лекарствения продукт в доза, по-висока от препоръчаната, незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Ибупром Спринт Капс

Ибупром Спринт Капс е предназначен за незабавно, краткотрайно лечение за облекчаване на болка.

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата единична доза.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Ибупром Спринт Капс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава

Те включват :

- Чести нежелани реакции /1-10% от пациентите/ - гадене, липса на апетит, повръщане, пирозис, диспепсия, флатуленция, диария, запек, болки в епигастриума, задух, влошаване на бронхиална астма, главоболие, вертиго, свръх-възбудимост, пруритус, уртикария, пурпура, обрив, задръжка на течности и отоци
- Нечести /0,1-1% от пациентите/ - хипертония, промяна на вкуса, повишени трансаминази /SGOT и SGPT/
- Редки /0,01-0,1% от пациентите/ - стомашно-чревен кръвоизлив, сънливост или безсъние, нарушения на кръвосъсирването, тромбоцитопения.
- Много редки /< 0,01% от пациентите/ - бъбречна папиларна некроза, която може да доведе до бъбречна недостатъчност, хемолитична анемия, гранулоцитопения и тромбоцитопения, булозни дерматози /включително екسفолитивен дерматит и мултиформена еритема/, неспецифични алергични реакции, анафилаксия, смущения на слуха и зрението.



Лекарства като Ибупром Спринт Капс могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент (миокарден инфаркт) или инсулт.

Нежеланите реакции се появяват по-рядко, когато лекарственият продукт се използва за кратко време.

При някои от пациентите може да се появят други нежелани реакции (не споменати в тази листовка).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, не описани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ИБУПРОМ СПРИНТ КАПС

Съхранявайте на място, недостъпно за деца..

Не използвайте Ибупром Спринт Капс след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Да се съхранява под 25° С.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Ибупром Спринт Капс

Активното вещество е : Ибупрофен – 200 mg

Другите съставки са:

Състав на капсулата: Макрогол 600, пречистена вода, калиева основа /твърда/

Състав на обвивката: желатин, син оцветител /E131/, смес, състояща се от сорбитол, 1,4-сорбитан, манитол и висши полиоли.

Опаковки

6 капсули – 1 блистер от 6 капсули

10 капсули – 1 блистер от 10 капсули

12 капсули – 1 блистер от 12 капсули

24 капсули – 2 блистера от 12 капсули

30 капсули – 3 блистера от 10 капсули

Притежател на разрешението за употреба

Cosmedica sp. z o.o.

Villardeczykowa 1/5

02-798 Warszawa

Полша

Производител

US Pharmacia Sp. Z o.o.

Ziebicka 40 ,

50-507 Wrocław

Полша

Дата на последно одобрение на листовката

Август 2008

