

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ГОСУДАРСТВА

11-3163, 15.10.08

КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ

2,5 % гел

КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ

2,5 % gel

Кетопрофен (*Ketoprofen*)

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 5 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел и за какво се използва
2. Преди да използвате КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел
3. Как да използвате КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % ГЕЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Как действа КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел?

КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ се отнася към групата на нестероидните противовъзпалителни и обезболяващи лекарствени продукти. Облекчава болката, възпалението и отока при обострените, болезнени мускулно-скелетни заболявания като се избягват характерните нежелани ефекти, които се наблюдават при приемането на нестероидни противовъзпалителни средства през устата.

Какво лекува КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел?


За симптоматично лечение на болката и отока при възпалителни заболявания и травми на ставите, ставните връзки, сухожилията и мускулите (артрит, периартрит, тендинит, бурсит, изкълчвания, контузии, увреждания на менискусите, схващания на врата, лумбаго).

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % ГЕЛ

Не използвайте КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел:

- ако сте свръхчувствителност към активното вещество, към ацетилсалицилова киселина или друго нестероидно противовъзпалително средство, анамнеза за бронхиална астма или алергично заболяване, провокирани от ацетилсалицилова киселина или друг нестероиден противовъзпалителен лекарствен продукт, както и към някое от помощните вещества.
- ако страдате от тежка сърдечна недостатъчност.
- при деца под 15-годишна възраст.

Обърнете специално внимание при употребата на КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел:



Продължителната употреба на продукти за локално приложение могат да доведат до свръхчувствителност! Да не се прилага при открити рани и секретиращи екземи. Да се внимава да не попадне върху лигавица и очите. Да не се излага намазаната повърхност на пряка слънчева светлина. Да не се използва в оклутивни превъръзки.

Въпреки, че системните ефекти са минимални, КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ трябва да се прилага с повишено внимание (обсъждане с лекар или фармацевт) при пациенти с тежки бъбречни и чернодробни заболявания, тежки сърдечно-съдови заболявания, стомашно-чревни кръвоизливи.

Нежеланите лекарствени реакции могат да бъдат намалени, като за контролиране на симптомите се употребява възможно най-ниската ефективна доза за възможно най-кратък срок от време

Взаимодействие с други лекарства:

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или нас скоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

При външно приложение на кетопрофен не са известни взаимодействия с други лекарства.

Въпреки това едновременната употреба на повече от един лекарствен продукт от групата на НСПВС, включително селективни COX-2 инхибитори, трябва да се избягва.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Не се препоръчва употребата на КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел от бременни и кърмещи жени, освен в случаите, когато ползата превишава риска за плода и само под лекарски контрол.

Шофиране и работа с машини

КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % ГЕЛ

Гелът се нанася (3-5 см или повече в зависимост от увреждането) върху кожата един или два пъти дневно, с леко масажиране за да се улесни проникването. Прилага се външно за мазане. Да не се прилага повече от 5 дни освен по лекарско указание.

Опитът при деца под 15 години е ограничен, поради което не се препоръчва употребата на КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел.

Ако сте използвали повече от необходимата доза КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел:

Няма опасност от предозиране при локално приложение. При много често намазване на големи повърхности могат да се наблюдават някои системни нежелани реакции. При случайно поглъщане на големи количества е необходимо промиване на устната кухина и стомаха, при нужда симптоматично лечение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В редки случаи е възможна появата на зачервяване, сърбеж, обриви, контактни дерматити или парене на мястото на приложение. Има единични съобщения за екзема, уртикария, ексфолиативни и контактни дерматити, реакции на фоточувствителност, токсична епидермална некролиза.

Последните проучвания показват, че сериозните кожни реакции, включително с летален изход, наблюдавани много рядко при употребата на НСПВС, се отнасят до случаи на ексфолиативен дерматит, синдром на Stevens-Johnson, токсична епидермална некролиза. Най-висок е рисъкът в началото на лечението – повечето случаи са наблюдавани през първия месец на лечението. Приемът

на лекарствения продукт трябва да бъде преустановен още при първите кожни или други признаци на свръхчувствителност.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % ГЕЛ

При температура под 25°C, далече от огън и пряка слънчева светлина.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност:

2 години.

Преди употреба погледнете датата на изтичане на срока на годност, която е отбелязана върху опаковката

Лекарственият продукт да не се използва след датата на изтичане срока на годност, посочена върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел?

1 g гел съдържа като активно вещество 25 mg Кетопрофен и като помощни вещества Карбомер, Етанол 96 %, Троламин, Метил парагидроксибензоат, Пречистена вода.

Как изглежда КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ 2,5 % гел и какво съдържа опаковката?

Безцветен, хомогенен, прозрачен гел, в алуминиева туба по 50 g, с вътрешно лаково покритие, поставена в индивидуална картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

ВЕТПРОМ АД, 2400 гр.Радомир, България, ул."Отец Паисий" № 26

тел.: 0777/8-24-93, 8-00-19

факс: 0777/8-23-91

e-mail: vetprom@abv.bg

Дата на последно одобрение на листовката 09/2008 г.

