


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА



Конакион® ММ /Конакион ММ

Vitamin K / Витамин К

Моля, прочетете внимателно тази листовка. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте лекуващия си лекар, медицинската сестра или фармацевта.

Какво представлява Конакион ММ?

Конакион ММ инжекционен разтвор съдържа лекарствената съставка phytomenadione (фитоменадион), която е синтетична форма на витамин К. Витамин К участва в механизмите на кръвосъсирването.

Всяка ампула съдържа 10 mg витамин К и допълнителните съставки гликохолева киселина, натриев хидроксид, лецитин, хидрохлорна киселина и вода.

Притежател на разрешението за употреба:

Рош България ЕООД, ул. "Бяло поле" № 16, София 1618, България

Производител:

F.Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland

За какво се използва Конакион ММ?

Конакион ММ се предписва от лекар и се инжектира за предпазване и лечение на кръвене, дължащо се на употребата на някои лекарства за разреждане на кръвта (антикоагуланти).

Освен това, в някои случаи, витамин К може да се инжектира на деца, когато те страдат от нарушения, повлияващи резорбцията на витамин К (хронична диария, кистична фиброза, запушване на жлъчните пътища (билиарна атрезия), хепатит, цьолиаксия), чернодробни заболявания, недохранени деца или деца, лекувани с някои антибиотици, при ниско ниво на протромбин или фактор VII на кръвосъсирването.

Кога Конакион ММ не трябва да се употребява?

- Ако сте алергични към Конакион ММ или някоя от съставките, които се съдържат в него. Поради това Вие трябва да уведомите лекуващия си лекар, ако знаете, че имате алергия или свръхчувствителност към Конакион ММ. Ако не сте сигурни за това, консултирайте се с лекуващия си лекар.

Кога трябва да бъдете много внимателни при приложението на Конакион ММ?

Непременно уведомете лекуващия си лекар, ако:

- имате чернодробно заболяване;
- имате изкуствена клапа на сърцето;



- ако сте приемали или приемате лекарства за разреждане на кръвта (антикоагуланти);
- ако приемате други лекарства (включително такива, които не са Ви предписани от Вашия лекар). Това е изключително важно, тъй като употребата на повече от едно лекарство едновременно може да засили или да отслаби ефектите на лекарствата и да повлияе кръвосъсирването.

Може ли Конакион ММ да се използва по време на бременност или кърмене?

Трябва да информирате лекуващия си лекар, ако сте бременна, мислите, че сте бременна или възнамерявате да забременеете. В такъв случай Вашият лекар ще обсъди това с Вас и ще реши дали трябва да Ви се приложи Конакион ММ.

Как трябва да се прилага Конакион ММ?

- Лекуващият лекар ще определи подходящата за Вас доза. Обичайната доза за възрастни е 10 – 20 mg, въпреки че на пациенти в напреднала възраст може да се приложи по-ниска доза. Обичайната доза за деца е 1 – 5 mg. Тя се прилага при внимателно наблюдение известно време след инжектирането. Може да се наложи прилагането на допълнителни дози.
- В някои случаи може да се извърши също и кръвопреливане.
- Ако сте приемали или приемате лекарства за разреждане на кръвта (антикоагуланти), може да Ви се каже да ги спрете или да промените дозата.
- Ако Ви е приложено твърде много лекарство или някой друг случайно изупотреби лекарството, веднага се свържете с лекуващия си лекар, фармацевта или най-близката болница.

Кога и как завършва лечението с Конакион ММ?

Обикновено, Вие ще получите еднократна доза Конакион ММ. Ако отговорът не е достатъчен, дозата може да се повтори по-късно.

Какви са възможните нежелани ефекти на Конакион ММ?

Освен благоприятните ефекти на Конакион ММ, рядко по време на лечението е възможно да възникнат нежелани ефекти, като алергични реакции, дори когато лекарството се прилага според указанията. Много рядко може да се получи дразнене или инфекция на мястото на инжектиране.

Ако получите нежелани ефекти или ако сте притеснени от това, консултирайте се с лекуващия си лекар.

Как трябва да се съхранява Конакион ММ?

- Да се съхранява под 25°C.
- Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.
- Това лекарство не трябва да се използва след датата на изтичане на срока на годност (EXP), отпечатана върху опаковката. Върнете неупотребеното лекарство на фармацевта. Запазете го, само ако лекарят Ви посъветва.



- **ЗАПОМНЕТЕ**, че това лекарство е за Вас. Само лекар може да Ви го предпише. Никога не го давайте на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите като Вашите.

Допълнителна информация:

Може да получите повече информация относно Kopakion MM от лекуващия си лекар или фармацевта.

Дата на изготвяне/Последна редакция

Февруари 2006 г.

