

Kytril® film tablets 1 mg and 2 mg



Китрил филмирани таблетки 1 mg и 2 mg Granisetron

Какво трябва да знаете за Китрил?

- След като лекарят назначи лечението Ви, моля, прочетете внимателно тази листовка.
- Пазете листовката, докато приключи лечението Ви. Може да пожелаете да я прочетете отново.
- Ако помагате на някого да приема Китрил, прочетете тази листовка, преди да дадете първата таблетка.
- Запомнете, че това лекарство е предназначено само за лицето, на което лекарят го е предписал. Не го давайте на други хора.
- Следвайте препоръките на лекаря и вземайте таблетките така, както са Ви предписани. Ако има нещо, което не разбирате, посъветвайте се с лекар или фармацевт.
- Винаги пазете лекарствата на места, недостъпни за деца.
- Това лекарство не трябва да се дава на пациенти, които са алергични към гранизетрон. (Ще намерите повече информация за това по-нататък в листовката.)
- Преди да започнете да приемате каквито и да е лекарства, трябва да информирате Вашия лекар, ако сте бременна (или мислите, че има вероятност да сте бременна) или, ако кърмите.
- Както всички лекарства, така и Китрил понякога може да предизвика нежелани реакции. (Ще намерите повече информация за това по-нататък в листовката.)
- За повече информация относно Китрил, моля, прочетете останалата част от тази листовка. Тази листовка не съдържа цялата информация за Вашето лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, обърнете се към лекаря или сестрата.

Какво представлява Китрил?

- Името на Вашето лекарство е Китрил. То съдържа лекарствената съставка гранизетрон под формата на гранизетрон хидрохлорид.
- Има следните таблетки Китрил:
- Таблетки 1 mg, съдържащи 1 mg гранизетрон
 - Таблетки 2 mg, съдържащи 2 mg гранизетрон.

Таблетките съдържат и неактивни съставки. Тези неактивни съставки са: микрокристална целулоза, натриево-нишестен гликолат, хидроксипропил метилцелулоза, лактоза, магнезиев стеарат, филмираща обвивка.

Китрил Ви се дава под формата на бели триъгълни таблетки, които трябва да се приемат през устата.

Китрил спада към групата на лекарствата, наречени антиеметици.

Китрил се произвежда от F. Hoffmann-La Roche, Basel, Switzerland.

Как действа Китрил?

Китрил е ефективен, когато Ви се гади или повръщате. Той е особено полезен, когато се нуждаете от лечение, което може да Ви накара да почувствате гадене или да повръщате.

Какво трябва да проверите, преди да Ви е даден Китрил?

Не трябва да Ви се дава това лекарство, ако сте алергични към гранизетрон. Ако мислите, че преди сте имали проява на алергична реакция (напр. обрив) към гранизетрон, трябва да уведомите Вашия лекар, преди да започнете да вземате таблетките Китрил.

Ако получите алергична реакция, докато вземате Китрил, спрете да приемате таблетките и незабавно информирайте лекаря или сестрата.

Ако имате запек (движението на червата е затруднено и ходите нередовно или със затруднение), обърнете се към Вашия лекар, преди да вземете таблетките си.

Ако при предишно лечение с Китрил са се проявявали някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар преди да вземете таблетките Китрил.

Ако наскоро сте взимали или вземате някакви други лекарства, кажете на лекаря преди да започнете да приемате Китрил.

Кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна.

Не трябва да приемате това лекарство, докато сте бременна, освен ако лекарят не Ви е препоръчал. Ако кърмите, уведомете Вашия лекар. Не трябва да вземате тези таблетки, ако кърмите, освен ако лекарят не Ви е посъветвал за това.

Как трябва да вземате Китрил?


Следвайте предписанието на лекаря за това как и кога да вземате Вашите таблетки.

Лекарят ще реши колко таблетки трябва да приемате всеки ден.

Не вземайте повече таблетки от предписаните от Вашия лекар.

Заедно с Китрил може да Ви бъде предписано и друго лекарство (кортикостероид). Лекарят ще прецени дали това ще е от полза за Вас.





Моля, прочетете етикета внимателно. Ако имате някакви въпроси относно Китрил и относно това как да го взимате, моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Трябва да приемате таблетките цели, с вода. Не ги дъвчете.

Следвайте съветите на лекаря за това кога да приемате таблетките си. Обикновено трябва да взимате една таблетка от 1 mg два пъти дневно (сутрин и вечер) или една таблетка от 2 mg веднъж дневно (по едно и също време всеки ден) за период до една седмица.

Продължавайте да взимате таблетките си толкова дълго, колкото Ви е казал лекаря.

Малко вероятно е да имате проблеми с предозиранието на Китрил. Моля, кажете на лекаря, ако вземете повече таблетки, отколкото Ви е предписал, и му покажете опаковката с таблетки.

Ако забравите да вземете таблетка Китрил, вземете я веднага, щом се сетите, и след това продължете да приемате таблетките в обичайното за това време.

Информация за възможни нежелани реакции

Може да почувствате главоболие, запек (движението на червата е затруднено и ходите нередовно или със затруднение) или леки кожни обриви, но обикновено тези симптоми са леки. Ако тези симптоми продължат или се засилят, обадете се на Вашия лекар.

Рядко могат да се проявят силни реакции, включващи симптоми като обрив със сърбеж, подуто лице и затруднение в дишането. Уведомете Вашия лекар при поява на сърбеж или обрив.

Ако почувствате някакво необичайно неразположение, докато приемате Вашето лекарство, информирайте лекаря незабавно.

Как да съхранявате Китрил?

Изтичането на срока на годност на това лекарство е написано на опаковката. Не използвайте лекарството след тази дата.

Съхранявайте таблетките си в оригиналната им опаковка.

Съхранявайте всички лекарства далече от деца – за предпочитане на недостъпно място.

Дата на одобрение на информацията за пациента

16 Май 1995



Допълнителна информация

За всякаква информация за този лекарствен продукт, моля обърщайте се към представителството на F. Hoffmann La-Roche в България.

3285502 BG 0211.1070

Адресът на представителството е:

Ул. «Парчевич» № 47
1000 София
тел.: (02) 988 3888



2 8 5 5 0 2

