

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА



LACIPIL™
film-coated tablets

ЛАСИПИЛ™
филмирани таблетки

lacidipine

Тази листовка се отнася само за Lacipil. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете приема на лекарството. Пазете я, тъй като може да ви се наложи да я прочетете отново. Консултирайте се с вашия лекуващ лекар, ако ви е необходима повече информация или съвет.

Наименование на лекарството
Името на лекарството е Lacipil (Ласипил).

Какво представлява и какво съдържа вашето лекарство

Lacipil е под формата на филмирани таблетки.

Таблетките Lacipil съдържат 2 mg, 4 mg или 6 mg от лекарственото вещество lacidipine (ласидипин).

Таблетките, съдържащи 2 mg lacidipine, са с кръгла форма, бели на цвят.

Таблетките, съдържащи 4 mg lacidipine, са овални, бели, с делителна линия от двете страни.

Таблетките, съдържащи 6 mg lacidipine, са овални, бели, двойно изпъкнали таблетки. Всяка таблетка съдържа и следните помощни вещества: лактоза монохидрат, повидон К30 и магнезиев стеарат, хипромелоза и Opaspray White M-1-7120 (хипромелоза, титанов диоксид E171, натриев бензоат) или Opadry White OY-S-7335 (хипромелоза и титанов диоксид E171).

Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му

Lacipil се произвежда от GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., 189 Grunwaldzka street, 60-322 Poznan, Poland или от GlaxoWellcome S.A., Avda. Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero (Burgos), Spain. Притежател на разрешението за употреба е Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex UB6 0NN, UK, представляван в България от GlaxoSmithKline ЕООД, София 1408, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов, бл. 10.

За какво се използва Lacipil

Лекарственото вещество lacidipine принадлежи към група лекарства, наричани калциеви антагонисти. Използва се за лечение на артериална хипертония (високо кръвно налягане).

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРИЕМА НА ЛЕКАРСТВОТО

Не започвайте да приемате Lacipil, ако сте алергични към lacidipine или някоя от останалите съставки на лекарството. Не трябва да приемате лекарството и ако страдате от тежка аортна стеноза или тежко чернодробно увреждане с чернодробна недостатъчност.

Важно е да уведомите лекуващия си лекар, ако

- Сте прекарвали наскоро инфаркт на миокарда.
- Страдате от заболяване на сърцето (стенокардия, нарушение на сърдечния ритъм, сърдечна недостатъчност).
- Имате рядко наследствено заболяване, свързано с непоносимост към някои захари.



Лекарствени и други взаимодействия

Моля, информирайте вашия лекар, ако приемате или скоро сте приемали други лекарства, дори и такива, които сте си купили сами, без лекарско предписание. Необходимо е особено внимание, ако:

- ◆ Приемате други лекарства за лечение на високо кръвно налягане.
- ◆ Приемате лекарства за лечение на нарушение на сърдечния ритъм.
- ◆ Приемате лекарства от групата на трицикличните антидепресанти.
- ◆ Приемате лекарствата erythromycin (еритромицин), terfenadine (терфенадин), cimetidine (симетидин).

Не трябва да приемате Lasicipil със сок от грейпфрут.

Бременност и кърмене

По време на бременност и кърмене лекарството може да се прилага **само** в случай, че лекарят прецени, че очакваните ползи от лечението на майката са по-големи от възможните рискове за детето.

Шофиране и работа с машини

Това лекарство няма да повлияе върху способността ви да шофирате или работите с машини.

След прием на първата доза от лекарството е възможно да се появи замаяност. Тази нежелана реакция е временна и изчезва при продължаване на лечението с Lasicipil в същите дози.

КАК СЕ ПРИЕМА LASICIPIL

Приемайте лекарството така, както лекарят ви е предписал. Не приемайте по-големи количества от предписаните ви от лекаря. Ако не сте сигурни как да приемате лекарството, консултирайте се с лекуващия лекар.

Обичайната начална дозировка на Lasicipil е 2 mg веднъж дневно. Лекарството трябва да се приема всеки ден по едно и също време, за предпочитане сутрин, независимо от храненето.

Лекарят може да прецени, че във вашия случай се налага дозата на лекарството да бъде увеличена до 4 mg и при необходимост до 6 mg, като увеличаването на дозата трябва да става с интервал от време най-малко няколко седмици.

Трябва да продължите да приемате лекарството дори след като почувствате подобрене. Не спирайте приема на лекарството, докато лекарят не ви каже.

Какво да направите в случай на предозирание

Ако случайно сте приели твърде много таблетки, незабавно потърсете лекарска помощ.

Какво да направите, ако сте пропуснали доза

Ако сте забравили да приемете някоя доза, не се безпокойте. Приемете дозата веднага, след като си спомните и продължете да приемате следващите дози точно според определеното време. Не приемайте повече таблетки, за да компенсирате пропуснатата доза.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Подобно на всички лекарства Lasicipil може да доведе до появата на нежелани лекарствени реакции. Най-често наблюдаваните нежелани реакции при лечение с Lasicipil са главоболие, зачервяване, оток, замаяност и сърцебиене. Тези реакции обикновено са леки и преходни, и изчезват при продължаване на лечението с Lasicipil в същите дози.



По-рядко е възможно да се появят: астения (обща умора), обрив, сърбеж, зачервяване на кожата, стомашен дискомфорт, гадене, често уриниране, набъбване и уплътняване на венците. Информирайте лекуващия лекар в случай, че наблюдавате някоя от гореспоменутите реакции.

Консултирайте се с вашия лекар, ако забележите други симптоми, които не са описани в тази листовка.

Как да съхранявате Lасіріі филмирани таблетки

Съхранявайте лекарството при температура под 30°C.

Да се пази от светлина. Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Ако се налага прием на половин таблетка от 4 mg, неприетата половинка трябва да се съхранява в оригиналната фолиева опаковка и да се приеме в рамките на следващите 48 часа. В противен случай трябва да се изхвърли.

Лекарството не трябва да се приема след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.

Lасіріі (Ласипил) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline Group of companies.

Дата на последна редакция на листовката: 01/2006

