

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**  
**Амлодипин Алкалоид®/Amlodipin Alkaloid®** таблетки 5 mg  
**Амлодипин Алкалоид®/Amlodipin Alkaloid®** таблетки 10 mg  
(амлодипин)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го претстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани ефекти, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Амлодипин Алкалоид и за какво се използва
2. Преди да приемете Амлодипин Алкалоид
3. Как да приемате Амлодипин Алкалоид
4. Възможни нежелани ефекти
5. Съхранение на Амлодипин Алкалоид
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АМЛОДИПИН АЛКАЛОИД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Амлодипин Алкалоид е представител на група лекарства, наречени калциеви антагонисти. Амлодипин Алкалоид се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония) и на определен тип гръдна болка, позната като гръдна жаба (ангина пекторис, стенокардия), една рядка форма на която е ангината на Принцметал или вариант. При пациенти с високо кръвно налягане Амлодипин Алкалоид действа като отпуска кръвоносните съдове така, че кръвта преминава по-лесно през тях. При пациенти с гръдна жаба Амлодипин Алкалоид подобрява захранването с кръв на сърдечния мускул, който по този начин получава повече кислород и в резултат се предотвратява гръдната болка. Амлодипин Алкалоид не осигурява моментално облекчение на гръдната болка при стенокардия.

**2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ АМЛОДИПИН АЛКАЛОИД**

**Не приемайте използвайте Амлодипин Алкалоид**

- Ако сте алергични към Амлодипин Алкалоид или други калциеви антагонисти или към някое от помощните вещества в таблетката. Алергията може да се прояви със сърбеж, зачервяване на кожата и затруднено дишане.



Ако отговоряте с “Да” на някой от следващите въпроси, съобщете го на Вашия лекар преди да започнете прием на амлодипин алкалоид.

- Току-що прживели ли сте сърдечен инфаркт или хипертонична криза?
- Страдате ли от чернодробно заболяване?
- Възрастта Ви под 18 години ли е?

Вашият лекар може да има съображения да настоява да приемате таблетките.

#### **Прием на други лекарства**

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Съобщете на Вашия лекар, ако приемате силденафил поради усиляването на хипотензивния ефект в комбинация с амлодипин.

Преди хирургична манипулация съобщете на вашия лекар или зъболекар, че приемате амлодипин.

#### **Прием на Амлодипин Алкалоид с храна и напитки**

Амлодипин Алкалоид може да се приема със и без храна. Не увеличавайте приема на сок от грейпфрут по време на лечение с амлодипин. Не употребявайте алкохол, докато приемате Амлодипин Алкалоид.

#### **Бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Преди да започнете прием на Амлодипин Алкалоид съобщете на Вашия лекар, ако сте бременна, предполагате, че сте бременна, или планирате да забременеете. Предпочита се да не приемате Амлодипин Алкалоид по време на бременността. Ако забременеете по време на лечение с Амлодипин Алкалоид, не се забавяйте да споделите с Вашия лекар. Амлодипин Алкалоид не бива да се приема в периода на кърмене.

#### **Шофиране и работа с машини**

Може да почувствате сънливост или замаяност. Не шофирайте, не работете с машини и не извършвайте дейности, изискващи концентрация на вниманието, докато не установите как Ви въздейства амлодипин. За да намалите риска от замаяване, не ставайте от леглото и не се изправяйте внезапно и бързо, особено ако сте в напреднала възраст.

#### **Важна информация относно някои от съставките на Амлодипин Алкалоид**

Амлодипин Алкалоид съдържа лактоза монохидрат (виж “допълнителна информация”). Ако Вашият лекар Ви е предупредил, че проявявате нетолерантност към някои захары, консултирайте се с него преди да започнете прием на това лекарство.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АМЛОДИПИН АЛКАЛОИД**

Винаги приемайте Амлодипин Алкалоид точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е 5 mg веднъж дневно. В последствие дозата може да се увеличи до 10 mg веднъж дневно в зависимост от индивидуалния отговор.



Най-добре е да приемате Амлодипин Алкалоид по едно и също време всеки ден с вода. Важно е да продължавате да приемате Амлодипин Алкалоид освен ако Вашият лекар не Ви посъветва друго.

Консултирайте се с Вашия лекуващ лекар или с педиатър относно употребата на това лекарство при деца. Необходимо е специално внимание.

Амлодипин Алкалоид не бива да се приема от деца (под 6-годишна възраст).

**Ако сте приели повече от необходимата доза Амлодипин Алкалоид**

Ако сте приели повече от необходимата доза, трябва веднага да се свържете с Вашия лекар. Симптомите на предозиране включват: силна замаяност, прилошаване, ускорена сърдечна дейност.

**Ако сте пропуснали да приемете Амлодипин Алкалоид**

Ако случайно сте пропуснали да вземете дневната си доза, продължете със следващата доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

**Ако сте спрели приема на Амлодипин Алкалоид**

Не преустановявайте внезапно приема на амлодипин. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт относно постепенното намаляване на дозата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

---

Както всички лекарства, Амлодипин Алкалоид може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Най-честите са: главоболие, отоци (подуване на глезените), обрив, лесна уморлемост, гадене, зачервяване, замаяване, подуване или болезненост на венците, сърцебиене (неравномерен или учестен пулс).

---

Следните ефекти са наблюдавани у някои пациенти, но връзката с лечението е амлодипин или с болестното състояние е неясна: сърдечна атака (инфаркт на миокарда), неравномерен сърдечен ритъм (аритмия) и болки в гръдния кош.

Всички лекарства могат да предизвикат алергични реакции. Сериозни алергични реакции са много редки и още по-рядко са животозастрашаващи. Всяко внезапно хриптене, затруднение в дишането, подуване на клепачите, лицето или устните, обрив или сърбеж (особено ако засяга цялото тяло) трябва веднага да бъде съобщено на лекаря.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани ефекти, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.



## 5. СЪХРАНЕНИЕ НА АМЛОДИПИН АЛКАЛОИД

Съхранявайте на място далеч от погледа и достъпа на деца.

Не използвайте Амлодипин Алкалоид след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка (за отбелязване срока на годност са използвани съкращения). Срока на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изваждайте таблетките от блистера предварително.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Подгответе Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

## 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### Какво съдържа Амлодипин Алкалоид

- Активната съставка е амлодипин.

Всяка таблетка на Амлодипин Алкалоид 5 mg съдържа 5 mg амлодипин (като амлодипин безилат 6.934 mg).

Всяка таблетка на Амлодипин Алкалоид 10 mg съдържа 10 mg амлодипин (като амлодипин безилат 13.869 mg).

- Другите съставки са лактоза монохидрат; микрокристална целулоза; магнезиев стеарат.

### Как изглежда Амлодипин Алкалоид и какво съдържа опаковката

Таблетките Амлодипин Алкалоид 5 mg са кръгли, двойно изпъкнали и бели с разделителна линия от едната страна.

Таблетките Амлодипин Алкалоид 5 mg са опаковани в PVC блистери и запечатани с алуминиево фолио по 10 таблетки във всеки блистер. Картонената кутия съдържа 30 таблетки (три блистера) и листовка за пациента.

Таблетките Амлодипин Алкалоид 10 mg са кръгли, двойно изпъкнали и бели с разделителна линия от едната страна.

Таблетките Амлодипин Алкалоид 10 mg са опаковани в PVC блистери и запечатани с алуминиево фолио по 15 таблетки във всеки блистер. Картонената кутия съдържа 30 таблетки (2 блистера) и листовка за пациента.

### Притежател на разрешението за употреба

"Алкалоид" ЕООД

бул. "Цар Борис III" № 21, ет.3, ап.1

гр.София, Р. България

tel. +359 2 917 70 50

fax. +359 2 917 70 51

e-mail. alkaloidsofia@abv.bg



Амлодипин Алкалоид®/Amlodipin Alkaloid®

Модул 1.3.1.3. Листовка: информация за потребителя

---

**Производител**

АЛКАЛОИД АД - Скопје

Бул. Александър Македонски 12

1000 Скопје, Република Македонија

тел: +389 2 31 04 000

факс: +389 2 31 04 021

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно одобрение на листовката .....

