

И А Л  
О Д О Б Р Е Н О  
ДАТА 28.03.06г.

## Информация за пациента

### Ламизил ДермГел, 15 g Lamisil® DermGel, 15 g

Тази листовка ви предоставя полезна информация за Ламизил® ДермГел и за това как да го използвате. Моля, прочетете я внимателно и я пазете, докато не изразходвате вашето лекарство. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към вашия лекар или фармацевт.

#### 1. Какво е Ламизил ДермГел?

Ламизил ДермГел е гел, 1 g от който съдържа лекарствено вещество - 10 mg terbinafine hydrochloride. Прилага се върху кожата.

В състава на Ламизил ДермГел са и следните помощни вещества: пречистена вода, етанол, изопропилов миристат, полисорбат, карбомер, сорбитан монолаурат, бензилов алкохол, натриев хидроксид, бутилиран хидрокситолуен.

Ламизил ДермГел можете да намерите в алюминиева туба от 15g.

#### 2. За какво се използва Ламизил ДермГел?

Ламизил ДермГел е антимикотик, който убива гъбичките, причинители на кожни инфекции. Ламизил ДермГел е предназначен за лечение на гъбички по краката (*tinea pedis*), в ингвиналните области (*tinea cruris*), по тялото - трихофития (*tinea corporis*).

Ламизил ДермГел се използва също за лечение на дрождеви инфекции като  *pityriasis versicolor* (разноцветен лишай).

#### Как да разберете, че имате някои от посочените проблеми?

Гъбичките по краката засягат обикновено и двата крака, но невинаги. Най-често се появяват между пръстите. Може да бъдат и по иззвивката на крака, долната или друга част на стъпалата. Най-срещаният тип гъбички по краката предизвиква напукване или лющене на кожата, възможни са и слабо отичане, мехури или рани. Ламизил ДермГел е предназначен за гъбички между пръстите на краката.

Ако обаче имате гъбична инфекция по ноктите (гъбички по или под нокътя), промяна в цвета и деформация (удебеляване, ронливост), трябва да се обърнете към лекар, защото този тип гъбична инфекция не се лекува с Ламизил ДермГел. Ламизил таблетки по лекарско предписание са предназначени за гъбички по ноктите.

Гъбичките в ингвиналните области се появяват по вътрешната част на бедрата - зоната на slabините, обикновено от двете страни, като често едната страна е по-засегната от другата. Може да се разпространят по-далеч, към задната част или нагоре по посока на стомаха. Явяват се също така и по участъци от тялото, в които кожата се прегъва (сгъвките), особено ако са влажни - гънките под гърдите или подмишниците или други подобни зони. Обривът е с ясно очертана граница и е възможно да има и мехури. Усеща се сърбеж.



**Гъбичките по тялото (трихофития)** може да се появят навсякъде, но най-често се откриват по главата, врата, лицето или ръцете. Обикновено изглеждат като червен обрив с формата на окръжност, може да се появят лющене и сърбеж.

**Pityriasis versicolor** (разноцветен лишай) се наблюдава по кожата като участъци с лющене, които се превръщат в бели петна поради загубата на кожен пигмент. Петната изпъкват предимно през лятото поради нормалното потъмняване на кожата около тях. Появяват се главно по торса, врата и ръцете и могат да се възобновяват в продължение на месеци, особено с топлото време и с потенето.

*Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни в причините за вашата инфекция.*

### **3. Преди да използвате Ламизил ДермГел**

**Не употребявайте Ламизил ДермГел:**

- ако сте алергични към някоя от съставките му, посочени в листовката.

*В този случай се консултирайте с вашия лекар или фармацевт, защото Ламизил ДермГел не е подходящ за вас.*

**Какви предпазни мерки трябва да съблюдавате при употребата на Ламизил ДермГел?**

Ламизил ДермГел трябва да се прилага само външно. Да се избягва всяка към контакт с лицето и очите или с наранени участъци от кожата, които алкохолът може да раздразни. При случайно попадане в окото внимателно изплакнете със студена вода. Консултирайте се с вашия лекар, ако дискомфортът продължи.

**Ако сте бременна или кърмите**

Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Ламизил ДермГел, ако сте бременна.

Terbinafine - активната съставка на Ламизил ДермГел, преминава в кърмата, поради което не трябва да се прилага в периода на кърмене. Не бива да се допуска бебето да има контакт с третирани участъци от кожата, включително гърдите.

#### **Употреба при деца**

Ламизил ДермГел не трябва да се използва при деца.

#### **Употреба на други медикаменти**

Преди да използвате Ламизил ДермГел, уведомете вашия лекар или фармацевт за всички лекарства – със или без лекарско предписание, които приемате или сте приемали наскоро.

Не прилагайте други медикаменти върху третирания участък

### **4. Как да използвате Ламизил ДермГел?**

Важно е да употребявате Ламизил ДермГел правилно. Внимателно следвайте инструкциите.

#### **Възрастни**

Прилагайте Ламизил ДермГел върху засегнатите участъци 1-2 пъти дневно 1 седмица.



Използвайте Ламизил ДермГел в продължение на препоръчаната една седмица, дори да забелязвате облекчение по-рано. Обикновено подобрене на симптомите се забелязва в рамките на няколко дни, но инфекцията може да се повтори, ако гелът не се използва редовно или приложението се прекрати прекалено рано.

- Почистете и подсушете инфицираното място и кожата около него, след което си измийте ръцете.
- Отвийте капачката и с нейна помощ продупчете отвора на тубата при първоначалната употреба.
- Внимателно изстискайте от тубата количество, достатъчно за нанасяне на тънък слой ДермГел върху засегнатото място и кожата около него.
- Нежно разтрийте.
- Затворете тубата с капачката.
- Измийте си ръцете, след като сте докосвали инфицираната кожа, за да не разпространите инфекцията върху себе си или върху другите.

Ако третирате инфекцията в зони, където кожата се прегъва, можете да слагате марлена превръзка, особено през нощта. В такъв случай използвайте нова, чиста марля всеки път, когато нанасяте гела.

При употребата на Ламизил ДермГел състоянието на кожата се подобрява след няколко дни. Но напълното възстановяване на засегнатата кожа, след като инфекцията е премахната, се постига по-дълго - възможно е до 4 седмици. Ламизил ДермГел ще продължи да действа и след като сте провели едноседмичния курс на лечение. Въпреки че след това няма да използвате гела, подобренето трябва да продължи.

**Ако не забелязвате подобрене на симптомите в рамките на 2 седмици от началото на лечението, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт.**

#### **Как да подпомогнете лечението?**

Поддържайте чиста засегнатата зона, като я миете редовно. Подсушете внимателно, без да търкате, като попивате нежно. Постарайте се да не чешете засегнатия участък, въпреки че може да ви сърби, за да не предизвикате допълнително усложнение и да забавите оздравителния процес или да разпространите инфекцията.

Тъй като тези инфекции могат да бъдат предадени и на други хора, използвайте индивидуална кърпа и дрехи, като често ги перете, за да се предпазите от повторно инфициране.

#### **Ако случайно сте погълнали ДермГел?**

Ако случайно е погълнат Ламизил ДермГел, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт.

#### **Ако сте пропуснали доза?**

Ако сте забравили да приложите гела, използвайте го веднага щом се сетите и след това продължете както обикновено. Ако сте си спомнили по време на следващата апликация, приложете нормалното количество и продължете както обикновено. Постарайте се да използвате гела според указанията. Важно е да не се пропускат апликации, за да се намали рисъкът от възвръщане на инфекцията.



## **5. Какви нежелани ефекти може да причини Ламизил ДермГел?**

При повечето хора е налице полза от употребата на Ламизил ДермГел. Но като всички лекарства понякога той може да причини нежелани ефекти при някои хора. Затова е важно да се имат предвид появата на зачеряване, сърбеж или слабо парене след използването му. Това са безвредни, слаби нежелани ефекти, които могат да се очакват при прилагането на гела.

В много редки случаи някои хора са алергични към Ламизил ДермГел, което може да доведе до оток и болка, обриви или уртикария. Ако забележите появата на някои от тези симптоми, спрете употребата на Ламизил ДермГел и веднага се консултирайте с вашия лекар или фармацевт.

*Ако установите някакъв нежелан ефект, различен от изброените, уведомете вашия лекар или фармацевт.*

## **6. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Няма.

## **7. Допълнителна информация**

*Срок на годност – 3 години*

Да не се използва след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.

*Условия за съхранение*

Да се съхранява при температура под 30 °C.

**Да се съхранява на място, недостъпно за деца!**

## **8. Производител**

Novartis Consumer Health SA, CH 1260, Nyon, Switzerland и Novartis Pharma Produktions GmbH, D-79664 Wehr, Germany

## **9. Притежател на разрешението за употреба**

Novartis Consumer Health SA, CH 1260, Nyon, Switzerland

## **Последна редакция на листовката**

Септември 2004 г.

