


LANZUL® / ЛАНЗУЛ
стамашно-устойчиви капсули 30 mg
Lansoprazole / лансопразол

**Състав**

Една стамашно-устойчива капсула Lanzul съдържа 30 mg lansoprazole.

Помощни вещества: неутрални пелети, хидроксипропил целулоза, тежък основен магнезиев карбонат, захароза, царевично нишесте, натриев лаурил сулфат, хидроксипропил метилцелулоза, метакрилатен кополимер, талк, макрогол, титаниев диоксид.

Свойства и действие

Lansoprazole подтиска активността на протонната помпа, ензима в стомашната лигавица, който спомага за секретирането на солна киселина. Впоследствие той намалява количеството и киселинността на стомашния сок, като по този начин предотвратява вредните ефекти върху лигавицата. Началото на действието се наблюдава след един до два часа след приема и ефектът продължава повече от 24 часа. Болката престава най-късно след няколко дни; увредената лигавица заздравява до няколко седмици. Продължителното приложение на lansoprazole може да предотврати рецидивирането на заболяването.

Lansoprazole се преработва в черния дроб.

Показания

Lanzul се препоръчва при болестни състояния, при които е необходимо подтискане на повишената секреция на солна киселина: язва на дванадесетопръстника и доброкачествена стомашна язва, гастро-езофагеална рефлуксна болест, премахване на *Helicobacter pylori* (в комбинация с антибиотици), синдром на Zollinger-Ellison и други състояния с повишена секреция на стомашната киселина.

Противопоказания

Не трябва да вземате Lanzul, ако сте свръхчувствителни към lansoprazole или към някоя от другите съставки на лекарството.

Предпазни мерки и предупреждения

Симптоматичното подобрение по време на лечение с lansoprazole не изключва наличието на евентуално злокачествено заболяване в стомаха или хранопровода. Необходимо е предварително да се изключи злокачествено заболяване.

Безопасността на lansoprazole при деца не е установена.

Препоръчва се пациенти с чернодробно увреждане да вземат най-малките ефективни дози тъй като клирънс (елиминирането) е намален при пациенти в напреднала възраст и при такива с чернодробно заболяване.

Този лекарствен продукт съдържа 55.55 mg захароза. Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, всяка доза набавя 55.55 mg до 111.1 mg захароза. Неподходящ при хора с вродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захаразно/изомалтазен дефицит.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, посъветвайте се с лекуващия си лекар.

Не е известен вреден ефект на lansoprazole за плода. Бременните жени може да го вземат, ако очакваната полза оправдава потенциалния риск за плода.

Кърменето трябва да се преустанови по време на лечение с lansoprazole.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма съобщения за повлияване на способността за шофиране и работа с машини при употреба на lansoprazole.

Взаимодействия

Уведомете лекуващия си лекар, ако вземате други лекарства, дори такива, които се отпускат без рецепта.



Lansoprazole намалява киселинността на стомашния сок и по този начин може да повлияе резорбцията на някои лекарства, като кетоконазол, естери на ампицилина, железни соли, дигоксин.

Lansoprazole може в изключителни случаи да стимулира отделянето на теофилин. Ако вземате сукралфат едновременно с lansoprazole, вземайте го най-малко 30 минути след Lanzul.

Дозировка и приложение

Спазвайте указанията на лекаря. Не променяйте дозата или продължителността на лечението, без преди това да се консултирате с вашия лекар. Обичайната дозировка е 1 капсула Lanzul дневно. Обичайната дозировка за премахване на *Helicobacter pylori* е 1 капсула Lanzul два пъти дневно в продължение на 1 до 2 седмици в комбинация с други лекарства. Най-високата препоръчвана доза Lanzul е 60 mg дневно; за пациенти с чернодробно увреждане - 30 mg дневно. При пациенти със синдрома на Zollinger-Ellison дозите може да бъдат значително по-високи. Лечението обикновено продължава 4 или 8 седмици, лечението да предотвратяване на рецидивите е продължително.

Приемайте дозата сутрин, преди закуска. Ако трябва да приемате лекарството два пъти дневно, вземайте една доза преди закуска, а втората – преди вечеря.

Поглъщайте капсулите цели. Ако не можете да ги преглътнете, отворете всяка капсула и смесете съдържимото с малко ябълков сок (приблизително 1 лъжица) и погълнете веднага, без да дъвчете.

Ако не сте взели лекарството в определеното време, вземете го колкото е възможно по-скоро. Ако обаче е почти време за следващата доза, вземете само следващата доза, без да я удвоявате.

Лекарството е предписано на вас и не трябва да го давате на други.

Предозиране

Ако сте взели твърде голяма доза Lanzul, консултирайте се с лекуващия си лекар. Лечението е симптоматично. Lansoprazole не се отстранява с хемодиализа.

Нежелани лекарствени реакции

Както всяко друго лекарство, Lanzul може да предизвика и нежелани лекарствени реакции. Те обикновено са леки и преходни и не се налага преустановяване на лечението. Най-често наблюдаваните нежелани лекарствени реакции са стомашно-чревните нарушения (диария, гадене, отделяне на газове или запек) и главоболие; по-редките ефекти включват обрив, световъртеж, сухота в устата, умора и симптоми на простудно заболяване, анафилактични реакции (уртикария, ангиоедем, анафилактичен шок). Ако мислите, че имате нежелани лекарствени реакции, които се дължат на лекарството, консултирайте се с лекуващия си лекар или фармацевта, особено ако проблемите са тежки или имате нежелани лекарствени реакции, които не са споменати в листовката.

Съхранение и срок на годност

Лекарството не трябва да се използва след датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката.

Да се пази от влага. Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Информация за предписване

Само по лекарско предписание.

Опаковка

14 капсули от 30 mg

Произведено от

Krka, d.d., Novo mesto, Slovenia

Редактирана

29 юни, 2000 г.

