



LEUKERAN™
Film-coated tablets

ЛЕУКЕРАН™
Филмирани таблетки

Chlorambucil

Тази листовка се отнася само за LEUKERAN. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете приема на лекарството. Запазете я, защото може да я прочетете отново. Не я изхвърляйте, докато употребявате лекарството.

Тази листовка ви информира за най-важното относно LEUKERAN. За повече информация или съвет се обърнете към лекаря.

1. Наименование на лекарството

Името на лекарството е **LEUKERAN (Леукеран)**.

2. Какво представлява и какво съдържа LEUKERAN

Всяка таблетка LEUKERAN съдържа 2 mg (милиграма) от лекарственото вещество chlorambucil (хлорамбуцил). Таблетките са кафяви на цвят, кръгли с филмово покритие и надпис "GX EG3" от едната страна, и "L" от другата.

LEUKERAN съдържа и неактивни помощни вещества, необходими за да се направи лекарствената форма: микрокристална целулоза, лактоза анхидрид, силиконов колоиден анхидрид, стеаринова киселина, хипромелоза, титанов диоксид, синтетичен жълт железен оксид, синтетичен червен железен оксид и макрогол.

LEUKERAN се предлага в бутилки от тъмно стъкло, защитени срещу отваряне от деца. Всяка опаковка съдържа 25 таблетки.

3. Кой произвежда лекарството и кой притежава разрешение за употребата му в България

LEUKERAN се произвежда от Heumann PCS GmbH, Nürnberger Strasse 12, 90537 Feucht, Germany. Притежател на разрешението за употребата му е Glaxo Group Ltd Greenford, Middlesex, UK, представляван в България от GlaxoSmithKline Export Ltd. ЕООД с адрес: София 1408, кв. Ив.Вазов, ул. Димитър Манов, бл.10.

4. За какво се използва LEUKERAN

LEUKERAN принадлежи към група лекарства, наричани цитостатици. Използва се за лечение на някои видове рак и някои заболявания на кръвта.

5. Кой може да приема LEUKERAN

Това лекарство е подходящо за много хора, но при някои употребата му е неподходяща. Преди да започнете приема проверете дали употребата на LEUKERAN е правилна във вашия случай и дали LEUKERAN е лекарство подходящо за вас.

Ако отговорите с "да" на някои от следните въпроси, уведомете лекаря за това преди да започнете да приемате лекарството:

- Имали ли сте някога прояви на алергия или повишена чувствителност към LEUKERAN или chlorambucil, или към някои от съставките на лекарството?
- Бременна ли сте?
- Планирате ли скорошна бременност, респективно скорошно бащинство?

LEUKERAN може да увреди вашата сперма, яйцеклетки и/или бебето. Необходимо е да използвате противозачатъчни средства, за да избегнете забременяване, докато вие или партньорът ви приемате лекарството. Обърнете се към лекаря за съвет.

- Кърмите ли?
- Имунизирани ли сте или планирате ли да се имунизирате с жива ваксина?
- Приемате ли, има ли вероятност да приемате phenylbutazone, докато се лекувате с LEUKERAN или скоро след това?



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

- Подложени ли сте в момента/ били ли сте подлагани наскоро на лъчетерапия и/или химиотерапия?
- Имали ли сте гърчове или припадъци?
- Имате ли заболявания на черния дроб или бъбреците?

6. Как да приемате лекарството

Важно е лекарството да бъде приемано в точно определеното време. Приемайте го както лекуващият лекар ви е препоръчал.

Дозировката на лекарството е индивидуално различна. Само лекарят може да я променя в хода на лечението.

Таблетките трябва да се поглъщат цели, с малко вода. Не трябва да се чупят, дъвчат или стриват на прах.

През различни периоди по време на лечението с LEUKERAN лекуващият лекар ще поиска да изследва вашите кръвни показатели, за да установи дали е необходима промяна в дозата.

Ако ви предстои операция, предупредете хирурга или анестезиолога, че приемате LEUKERAN.

7. Какво да направите, в случай че пропуснете прием

Ако сте забравили да приемете някоя доза, уведомете лекаря. Не приемайте двойна доза.

8. Какво да направите, в случай че приемете повече от предписаното

Ако сте приели прекалено висока доза LEUKERAN или някой друг от обкръжението ви, особено деца, е погълнал препаратата продукта по погрешка, уведомете незабавно лекуващия ви лекар или се обадете на Бърза помощ.

9. Причинява ли LEUKERAN нежелани реакции

LEUKERAN може да предизвика нежелани реакции при някои хора.

Има данни, че Leukeran може да причини карциноми при някои пациенти, лекувани с лекарството за продължителен период от време.

Синтезата на клетки в костния мозък може да бъде намалена.

При жени може да има смущения в менструалния цикъл.

При мъже може да спре или да се наруши продукцията на сперма.

Някои хора имат алергии към лекарства. Ако някои от следните симптоми се появи скоро след приемане на LEUKERAN, **СПРЕТЕ** приема на лекарството и уведомете незабавно лекуващия ви лекар:

- внезапен задух, болка и стягане в гърдите, хрипове;
- оток на клепачите, лицето, устните, устата и езика;
- релефен кожен обрив или копривна треска по цялото тяло.

Консултирайте се незабавно с лекуващия ви лекар, ако се появят следните нежелани реакции, докато приемате LEUKERAN:

- ако не се чувствате добре, имате загуба на апетит, диария, повръщане или афти в устата;
- ако забележите признаци на жълтеница (пожълтяване на кожата и/или бялото на очите);
- ако почувствате необичайна умора или забележите признаци на обрив, треска или инфекция, напр. цистит;
- ако получавате необичайни охлузвания или кървене;
- ако получите гърчове;
- ако развиете упорита кашлица или не ви достига въздух;
- ако забележите признаци на изтръпване или слабост на мускулите;
- ако усетите конвулсивни движения.

Информирайте лекуващия ви лекар, ако забележите други нежелани реакции, които не са отбелязани в тази листовка или ако има нещо, което ви тревожи, смущава или не го разбирате.

10. Как се съхранява лекарството

Съхранявайте LEUKERAN на сухо място при температура между 2 и 8°C.

Съхранявайте лекарството на места, недостъпни за деца.



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Не приемайте лекарството след изтичане на срока на годност, обозначен върху опаковката. Препоръчително е след като преустановите приема на лекарството да върнете неизползваните таблетки на лекаря или фармацевта, за да бъдат съхранявани или унищожени безопасно.

ЗАПОМНЕТЕ!

Това лекарство е единствено за вас. Само лекар може да ви го предпише. Никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите или подобни на вашите.

Leukeran (Леукеран) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

Дата на последното преразглеждане: ~~02 юли 2004 г.~~ 12 септември 2005

Издание №: 43 14

